

### ЕЩЕ РАЗ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ СПИДА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ РЕГИОНЕ

**Сан-Сальвадор, Сальвадор, 11 ноября 2005 года** – «Быстрое и существенное увеличение национальной, региональной и международной поддержки для Латинской Америки и Карибского региона имеет важнейшее значение, для того чтобы этот регион смог опередить развивающиеся здесь многообразные эпидемии», – заявил сегодня Исполнительный директор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

«Эпидемии СПИДа в Латинской Америке и Карибском регионе недостает наглядности – в частности, что касается стран Центральной Америки. Необходимо срочно усилить приверженность делу борьбы со СПИДом для этого региона и внутри самого региона», – сказал д-р Питер Пиот, выступая на пленарном заседании в ходе Центральноамериканского конгресса по БППП/ВИЧ/СПИДу (КОНКАСИДА) и Форума по СПИДу для Латинской Америки и Карибского региона в Сальвадоре (8–11 ноября 2005 года).

Обращаясь к участникам пленарного заседания, д-р Пиот подчеркнул значительные шаги, сделанные в данном регионе для расширения доступа к лечению. В то же время он добавил, что эти достижения в расширении доступа к лечению должны быть устойчивыми и должны охватывать весь регион. Учитывая, что в некоторых странах число людей, живущих с ВИЧ, как никогда велико, д-р Пиот особо отметил острую потребность в параллельном усилении программ профилактики ВИЧ, охватывающих всех людей, которым грозит риск инфицирования, в частности, тех, кто подвергается самой сильной маргинализации, например, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и работников секс-бизнеса.

«В регионе необходимо оживить стратегии, чтобы охватить тех, кому грозит самый высокий риск – причем они должны быть направлены на устранение глубоко укоренившихся факторов, влияющих на уязвимость, таких как социальный остракизм и различного рода неравенство», – отметил он.

В 2004 году более 1,7 миллиона людей в Латинской Америке жили с ВИЧ и 240 000 человек заразились инфекцией. Особенно сильно пострадала Центральная Америка: национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения превысил 1% в двух странах региона – Гватемале и Гондурасе. Карибский регион, где средний показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения составляет 2%, является вторым наиболее пострадавшим регионом в мире после Африки к югу от Сахары.

Выступая утром перед заключительным мероприятием в рамках конференции – Саммитом президентов стран Центральной Америки, – д-р Пиот призвал руководителей региона подтвердить и активизировать свои обязательства на самом высоком политическом уровне и договориться о конкретных мерах, которые будут превращены в конкретные действия для усиления мер в ответ на СПИД на национальном и региональном уровне.

«История СПИДа показала нам, что, объединившись, народ победит. Успех зависит от подлинной приверженности каждого из нас делу разрешения этого исключительного кризиса», – сказал д-р Пиот.

---

*За более подробной информацией просьба обращаться к Лусиано Мильомему, Сальвадор, тел: +503 7937 5710 или Бет Маньи-Уоттс, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 5074 или же посетите веб-сайт ЮНЭЙДС [www.unaids.org](http://www.unaids.org).*