



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС

УВКБ · ЮНИСЕФ · МПП · ПРООН · ЮНФПА
ЮНОДК · МОТ · ЮНЕСКО · ВОЗ · ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Информационный бюллетень

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

В настоящее время в Карибском регионе насчитывается более 440 000 людей, живущих с ВИЧ, включая 53 000 человек, заразившихся вирусом только в 2004 году. По оценкам, в этом же году от СПИДа умерли 36 000 человек. В 2004 году в Карибском регионе было 210 000 женщин, живущих с ВИЧ.

- При показателе распространенности ВИЧ среди взрослых в 2,3% Карибский бассейн представляет собой второй наиболее пострадавший регион мира после Африки к югу от Сахары.
- В целом, наиболее высокий уровень инфицирования ВИЧ среди женщин в Америке приходится на карибские страны, причем СПИД стал здесь ведущей причиной смертности среди взрослого населения в возрасте 15-44 лет. По прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни при рождении на Гаити в 2010 году будет на 10 лет меньше, чем это имело бы место при отсутствии СПИДа.
- В отличие от Латинской Америки, передача ВИЧ в Карибском регионе происходит преимущественно в результате гетеросексуальных контактов (на настоящий момент почти две трети всех случаев СПИДа приходится на этот путь передачи ВИЧ).
- В настоящее время в Карибском регионе число новых ВИЧ-инфекций среди женщин превышает число таких инфекций среди мужчин. Последние оценки указывают на то, что в настоящее время в этом регионе число женщин, живущих с ВИЧ, примерно равно числу мужчин. Согласно данным обследования, проведенного среди населения в 2002 году, вероятность наличия ВИЧ-инфекции среди женщин моложе 24 лет в Доминиканской Республике была почти в два раза выше, чем среди мужчин того же возраста.
- На Гаити по-прежнему самое высокое число людей, живущих с ВИЧ, в Карибском регионе – около 280 000 по состоянию на конец 2003 года.
- Последний раунд эпиднадзора за ВИЧ, проведенного среди беременных женщин, указывает на то, что показатель распространенности ВИЧ в различных частях Гаити колеблется от 1,8% до почти 7%. Проведенный недавно надзор за поведением продемонстрировал, что значительная часть преимущественно молодого населения страны (около 60% населения моложе 24 лет) является сексуально активной и практикует незащищенный секс, и, согласно результатам обследования, 18% городских женщин в возрастной группе 15-19 лет указали, что у них была, по крайней мере, одна беременность.

- На Ямайке регистрируется второй после Гаити годовой показатель заболеваемости СПИДом и смертности от СПИДа в этом регионе. По оценкам, на конец 2003 года число людей, живущих с ВИЧ, на Ямайке составляло 22 000. В то время как несколько других островных государств региона предпринимают все более широкие шаги против эпидемии за счет расширения доступа к антиретровирусному лечению, на Ямайке с 1999 года ежегодно регистрируется не менее 900 случаев СПИДа. За этот же период от СПИДа ежегодно умирало от 590 до 690 человек – это более чем в два раза превышает показатель, зарегистрированный всего четырьмя годами ранее.
- В то же время на Багамских Островах и Барбадосе имеются данные о том, что принятие более сильных мер профилактики начиная с конца 1990-х годов, возможно, снижает уровни распространенности ВИЧ. На Багамских Островах показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин снизился с 4,8% в 1993 году до 3,6% в 1996 году и до 3% в 2002 году. На Барбадосе за период с 1999 по 2003 годы показатель диагностирования новых ВИЧ-инфекций среди беременных женщин значительно уменьшился, с 0,7% до 0,3%.
- Доминиканской Республике по-прежнему грозит серьезная эпидемия ВИЧ, если учитывать, что общенациональный показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин превышает 2%. В столице страны Санто-Доминго показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин в возрасте 15-24 лет, – который может служить индикатором уровня инфицированности в последнее время, – снизился примерно с 3% в 1995 году до уровня ниже 1% в 2003 году.
- Хотя на Кубе и отмечается очень низкий показатель распространенности ВИЧ, эпидемия сейчас нарастает. С конца 1990-х годов отмечен резкий рост числа новых случаев ВИЧ – за период с 1995 по 2000 годы ежегодное число новых регистрируемых случаев увеличилось почти в пять раз.
- Отсутствие качественных данных эпиднадзора за ВИЧ в большинстве карибских стран препятствует разработке и реализации потенциально эффективных программ профилактики и, вполне вероятно, подорвет усилия, направленные на расширение доступа к антиретровирусному лечению.
- Широко распространенная гомофобия создает идеальный климат для распространения ВИЧ, поскольку это еще более изолирует мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и не позволяет им получить информацию и услуги, а также гарантии для защиты от ВИЧ. В то же время неравный социально-экономический статус женщин и мужчин является мощной динамической силой в развитии эпидемий, которые нарастают в условиях стигмы, неправильных представлений и отрицания.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org.