

## FAITS ET CHIFFRES MONDIAUX

*Le nombre de personnes vivant avec le VIH a désormais augmenté, pour atteindre son niveau le plus élevé jamais enregistré : près de 40 millions de personnes vivent avec le virus et près de 5 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2004 seulement. Dans le monde entier, l'épidémie de SIDA a tué plus de 3 millions de personnes au cours de la seule année écoulée.*

### Vue d'ensemble

- Le nombre de personnes vivant avec le VIH s'est accru dans chaque région, et les augmentations les plus marquées sont survenues en Asie de l'Est, en Europe orientale et en Asie centrale où l'épidémie a été multipliée par neuf en moins de dix ans.
- L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée de la planète. La région abrite un peu plus de 10% de la population mondiale, mais elle compte plus de 60% des personnes vivant avec le VIH et plus des trois quarts de toutes les femmes vivant avec le VIH.
- Les populations de plusieurs nations asiatiques sont si vastes que même une faible prévalence du VIH au niveau national se traduit par des millions de personnes vivant avec le VIH. Sans une action immédiate, la région pourrait compter 12 millions de nouvelles infections supplémentaires entre 2005 et 2010.
- Sur le plan mondial, les Caraïbes viennent immédiatement après l'Afrique subsaharienne en termes de taux de prévalence. Globalement, les niveaux les plus élevés d'infection à VIH parmi les femmes dans les Amériques sont enregistrés dans les pays des Caraïbes et le SIDA est devenu la cause principale de décès dans les Caraïbes parmi les adultes de 15 à 44 ans.

### Statistiques régionales

	Personnes vivant avec le VIH	Nouvelles infections 2004	Décès dus au SIDA 2004	Prévalence chez les adultes %
<b>Afrique subsaharienne</b>	25,4 millions	3,1 millions	2,3 millions	7,4%
<b>Asie</b>	8,2 millions	1,2 million	540 000	0,4%
<b>Amérique latine</b>	1,7 million	240 000	95 000	0,6%
<b>Amérique du Nord &amp; Europe occidentale &amp; centrale</b>	1,6 million	64 000	23 000	0,4%
<b>Europe orientale &amp; Asie</b>	1,4 million	210 000	60 000	0,8%

<b>centrale</b>				
<b>Moyen-Orient &amp; Afrique du Nord</b>	540 000	92 000	28 000	0,3%
<b>Caraïbes</b>	440 000	53 000	36 000	2,3%
<b>Océanie</b>	35 000	5 000	700	0,2%
<b>Total</b>	<b>39,4 millions</b>	<b>4,9 millions</b>	<b>3,1 millions</b>	<b>1,1%</b>

## Prévention

- A ce stade de l'épidémie, il y a plus de nouvelles infections à VIH chaque année (environ cinq millions) que de décès liés au SIDA (environ trois millions).
- Actuellement, seule une personne sur cinq qui a besoin de prévention du VIH dans le monde a accès aux services de prévention de base, et seule une personne sur dix vivant avec le VIH a été testée pour le virus.
- En Afrique subsaharienne, seules 5% des femmes enceintes vivant avec le VIH ont accès aux services qui empêcheraient le virus d'infecter leurs enfants.
- Le nombre de nouvelles infections doit être considérablement réduit au cours des quelques années à venir pour faire en sorte que l'expansion du traitement antirétroviral reste viable aux niveaux économique et social.
- On estime que la mise en œuvre d'un ensemble complet de services de prévention du VIH pourrait éviter 29 millions (ou 63%) sur les 45 millions de nouvelles infections que l'on s'attend à enregistrer entre 2002 et 2010.

## Traitement

- Selon le dernier rapport d'activité ONUSIDA/OMS '3 millions d'ici 2005', un million de personnes vivant avec le VIH reçoivent actuellement une thérapie antirétrovirale (ARV) dans les pays en développement – cela signifie que seules 15% des personnes qui en ont besoin en bénéficient.

Région géographique	Nbre estimé de personnes bénéficiant de la thérapie ARV, 2005	Nbre estimé de personnes ayant besoin de la thérapie ARV, 2005	Couverture par la thérapie ARV, juin 2005
<b>Afrique subsaharienne</b>	500 000	4 700 000	11%
<b>Amérique latine &amp; Caraïbes</b>	290 000	465 000	62%
<b>Asie de l'Est, du Sud &amp; du Sud-Est</b>	155 000	1 100 000	14%
<b>Europe &amp; Asie centrale</b>	20 000	160 000	13%
<b>Moyen-Orient &amp; Afrique du Nord</b>	4 000	75 000	5%
<b>Total</b>	<b>970 000</b>	<b>6,5 million</b>	<b>15%</b>

**Note : Certains chiffres ne s'additionnent pas car ils ont été arrondis**

## Besoins en ressources

- D'après les dernières estimations de l'ONUSIDA, 22 milliards de dollars seront nécessaires en 2008 pour inverser la propagation du SIDA dans le monde en

développement.

- Pour le traitement et la prise en charge, 55% de ces ressources seront requises en Afrique subsaharienne, 20% en Asie et dans le Pacifique, 17% en Amérique latine et dans les Caraïbes, 7% en Europe orientale et 1% en Afrique du Nord et au Proche-Orient.
- Selon les dernières projections de l'ONUSIDA, on estime que 8 milliards de dollars au total sont disponibles en provenance de toutes les sources en 2005, montant qui s'élèvera à 9 milliards de dollars en 2006 et à 10 milliards de dollars en 2007.

**Besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA (en milliards de dollars)**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Prévention</b>	8,4	10,0	11,4
<b>Traitement et prise en charge</b>	3,0	4,0	5,3
<b>Orphelins &amp; enfants vulnérables</b>	1,6	2,1	2,7
<b>Coûts des programmes</b>	1,5	1,4	1,8
<b>Ressources humaines</b>	0,4	0,6	0,9
<b>Total</b>	<b>14,9</b>	<b>18,1</b>	<b>22,1</b>

---

*Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Luciano Milhomem, ONUSIDA Brésil, tél. +55 61 30 38 9222, mobile +55 61 997 67 828, Jacqueline Daldin, ONUSIDA Genève, tél. +41 22 791 3501 ou Beth Magne-Watts, ONUSIDA Genève, tél. +41 22 791 5074 ou consulter le site [www.unaids.org](http://www.unaids.org).*