

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

El VIH sigue reforzando su presencia en Oriente Medio y África del Norte, donde las últimas estimaciones indican que 92 000 personas contrajeron la infección por el VIH en 2004. El VIH se transmite por diferentes vías en esta región, incluidas las relaciones sexuales remuneradas, las relaciones sexuales entre varones y el consumo de drogas intravenosas, y existe un margen significativo para una ulterior expansión de la epidemia.

- El número total de personas que viven con el VIH en esta región se eleva a 540 000. Se estima que en 2004 vivían con el virus unas 250 000 mujeres. Ese mismo año, el SIDA se cobró la vida de alrededor de 28 000 personas.
- En la mayoría de los países de Oriente Medio y África del Norte, las epidemias se encuentran todavía en sus fases iniciales, lo que acrecienta las probabilidades de que los esfuerzos eficaces de prevención puedan limitar una ulterior propagación del virus.
- Asolado por la guerra civil y las crisis humanitarias, el Sudán sigue siendo el país más afectado de la región, con una epidemia concentrada principalmente en el sur. Las últimas estimaciones indican que más del 2% de la población adulta estaba viviendo con el VIH a final de 2003: unas 400 000 personas, que representan más del 80% de todas las que viven con el VIH en la región.
- La epidemia de Libia está experimentando un crecimiento espectacular. Cerca del 90% de las 5160 infecciones por el VIH entre libios notificadas oficialmente (a final de 2002) se produjeron tan sólo durante el periodo 2000-2002. La inmensa mayoría de los casos de VIH comunicados --más del 90%-- se atribuye al consumo de drogas intravenosas.
- En El Cairo, la capital de Egipto, los consumidores de drogas intravenosas presentan altos niveles de comportamientos de riesgo, lo que brinda una excelente oportunidad para que el VIH se propague de tales consumidores a sus parejas sexuales. Más de la mitad de ellos (55%) comunican que utilizaron equipos de inyección no estériles durante el último mes. Entre las tres cuartas partes de los consumidores de drogas intravenosas que eran sexualmente activos, casi los dos tercios nunca habían utilizado un preservativo.
- Las infecciones por el VIH en Argelia, Bahrein, Kuwait y Omán también se han atribuido al consumo de drogas intravenosas.
- Alrededor del 15% de todas las infecciones por el VIH ocurridas desde el comienzo de la epidemia en el Irán se notificaron sólo en 2003. Aunque el incremento observado indica en parte la ampliación de la vigilancia, es casi seguro que también denota una escalada reciente en una epidemia que está impulsada principalmente por el consumo de drogas intravenosas.
- Según un estudio, cerca de la mitad de los consumidores de drogas intravenosas del Irán estaban casados, y un tercio de los encuestados indicó que tenía relaciones extramatrimoniales, lo que subraya el potencial de ulterior propagación. Es probable que esta oleada secundaria de infecciones también ponga en situación de riesgo a los profesionales del sexo (y sus demás clientes).

- Como en otras partes de la región, en el Irán los profesionales del sexo parecen estar mal preparados para evitar la infección por el VIH. Un estudio entre profesionales del sexo de la ciudad de Kermanshah comprobó que todos conocían los preservativos, pero sólo la mitad los había utilizado alguna vez. En ese país, tanto los profesionales del sexo como sus clientes citan el elevado precio de los preservativos como principal motivo para restringir su uso.

Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Dominique De Santis, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 4509 o móvil (+41 79) 254 6803, o Annemarie Hou, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 4577. Para solicitar más información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org.