



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС

УВКБ • ЮНИСЕФ • МПП • ПРООН • ЮНФПА
ЮНОДК • МОТ • ЮНЕСКО • ВОЗ • ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Информационный бюллетень

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

ВИЧ продолжает усиливать свое присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 2004 году ВИЧ заразились почти 92 000 человек. ВИЧ в регионе передается различными путями, включая коммерческий секс, половые контакты между мужчинами и употребление инъекционных наркотиков, причем существует значительный потенциал для роста эпидемии.

- Общее число людей, живущих с ВИЧ в этом регионе, достигло 540 000. В 2004 году насчитывалось около 250 000 женщин, живущих с вирусом. В 2004 году, по оценкам, от СПИДа умерли 28 000 человек.
- В большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки эпидемии все еще находятся на своей ранней стадии – это повышает шансы на то, что эффективные профилактические меры могут ограничить дальнейшее распространение вируса.
- Судан, разоряемый гражданской войной и гуманитарным кризисом, остается наиболее пострадавшей страной в регионе, где эпидемия концентрируется в основном на юге. Последние оценки показывают, что по состоянию на конец 2003 года более 2% взрослого населения жили с ВИЧ – около 400 000 человек, что составляет более 80% всех людей, живущих с ВИЧ, в этом регионе.
- Эпидемия в Ливии нарастает драматически – почти 90% из 5160 ВИЧ-инфекций, официально зарегистрированных среди ливийцев (на конец 2002 года), были отмечены только за период 2000-2002 годов. Огромное большинство – более 90% – зарегистрированных случаев ВИЧ обусловлены употреблением инъекционных наркотиков.
- Рискованное поведение среди потребителей инъекционных наркотиков в столице Египта Каире распространено широко, и, согласно последним исследованиям, существует значительный потенциал для передачи ВИЧ от потребителей инъекционных наркотиков их сексуальным партнерам. Более половины из них (55%) пользовались нестерильным инъекционным инструментарием в последний месяц. Три четверти потребителей наркотиков вели половую жизнь, однако из них почти две трети никогда не пользовались презервативом.
- В Алжире, Бахрейне, Кувейте и Омане распространению ВИЧ-инфекции также способствует употребление инъекционных наркотиков.
- С момента начала эпидемии в Иране около 15% всех ВИЧ-инфекций были зарегистрированы в 2003 году. Такой рост частично отражает расширение эпиднадзора, однако это, почти безусловно, отражает нарастание эпидемии в последнее время преимущественно за счет употребления инъекционных наркотиков.
- Согласно результатам одного исследования, около половины потребителей инъекционных наркотиков состояли в браке, причем треть опрошенных

потребителей указали на наличие у них внебрачных половых контактов, что указывает на потенциальные возможности для дальнейшего распространения вируса. Такая вторичная волна распространения инфекции, вероятно, приведет к возникновению риска заражения также для работников секс-бизнеса (и их клиентов).

- Как и в других странах региона, работники секс-бизнеса в Иране, вероятно, плохо оснащены, для того чтобы предупредить заражение ВИЧ-инфекцией. Одно исследование, проведенное среди работников секс-бизнеса в иранском городе Керманшах, показало, что почти все работники секс-бизнеса знали о презервативах, но лишь 50% из них когда-либо пользовались ими. Как работники секс-бизнеса, так и их клиенты, обследованные в Иране, указали, что высокие цены на презервативы являются основной причиной отказа от их использования.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org.