



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС

УВКБ · ЮНИСЕФ · МПП · ПРООН · ЮНФПА
ЮНОДК · МОТ · ЮНЕСКО · ВОЗ · ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Информационный бюллетень

ОКЕАНИЯ

По оценкам, в Океании число людей, живущих с ВИЧ, составляет 35 000 человек. Хотя, как считается, в 2004 году от СПИДа умерли менее 700 человек, число новых ВИЧ-инфекций, по оценкам, составляет около 5000. В 2004 году в регионе насчитывалось 7100 женщин, живущих с ВИЧ.

- В Австралии ежегодное число новых диагнозов ВИЧ выросло с 650 в 1998 году приблизительно до 800 в 2002 году. Все больший процент таких диагнозов регистрировался среди людей, которые заразились в предшествующем году, – это позволяет предположить, что рост новых диагнозов, возможно, связан с возобновлением практики небезопасного секса.
- Как и в Новой Зеландии, в Австралии ВИЧ по-прежнему передается в результате половых контактов между мужчинами, на которые приходилось более 85% новых диагнозов ВИЧ в течение периода с 1997 по 2002 год. Около 4% новых инфекций, зарегистрированных в этот период, были обусловлены употреблением инъекционных наркотиков и 8,5% – гетеросексуальными контактами.
- Начиная с 1993 года, удельный показатель распространенности ВИЧ среди коренного населения в Австралии был таким же, как и среди некоренного населения. Однако более высокий процент таких диагнозов приходится на женщин и связан с употреблением инъекционных наркотиков.
- По крайней мере, половина из оценочного числа в 14 000 человек, живущих с ВИЧ в Австралии, получают антиретровирусную терапию, что отражает как возраст австралийской эпидемии, так и широкий доступ к лечению.
- Папуа – Новая Гвинея, которая расположена на одном острове с провинцией Папуа, одной из наиболее пострадавших провинций Индонезии, имеет самый высокий показатель распространенности ВИЧ в Тихоокеанском регионе. В конце 2003 года около 16 000 человек из примерно 2,5 миллиона взрослого населения были ВИЧ-инфицированы.
- Число ВИЧ-инфекций, диагностированных среди молодых женщин (15-24 лет) в Папуа – Новой Гвинее, оказалось более чем в два раза выше, чем среди мужчин того же возраста. В 2003 году общее число ВИЧ-инфекций, зарегистрированных среди женщин, впервые превысило число инфекций среди мужчин.
- Уровни инфицирования ВИЧ в других частях Океании выглядят очень низкими, однако имеющиеся данные сильно ограничены. На удаленных островах самый высокий риск, вероятно, грозит морякам и их партнерам, среди них также зарегистрирован высокий уровень других инфекций, передающихся половым путем.

- Как только ВИЧ проникает в крохотное по численности население островных государств в Океании, это может повлечь за собой диффузные эпидемии. Срочно требуются стратегии профилактики, направленные на уменьшение числа инфекций, передающихся половым путем, и лечение инфицированных, а также на быстрое увеличение знаний по проблеме СПИДа среди населения в целом.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org.