

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA EN

# CAMERÚN

Número de habitantes	<b>18,500,000</b>
Porcentaje del número de habitantes representados por la franja etaria de 0 a 14 años	<b>42.8%</b>
Porcentaje de seroprevalencia en la población general (2004)	<b>5.5%</b>
Índice de infección entre mujeres y hombres	<b>1:7</b>
Cantidad de personas examinadas en 2008	<b>590,325 o 39% del objetivo fijado</b>
De las 590 325 personas examinadas, cantidad que son seropositivas	<b>64,930 o 11.5%</b>
Porcentaje de mujeres encintas que son seropositivas	<b>6.51%</b>
Cantidad de mujeres encintas seropositivas que recibieron la profilaxis antirretroviral para reducir la transmisión de la madre al niño	<b>10,114 (contra 6,213 en 2007)</b>
Cantidad de niños nacidos de madres seropositivas que recibieron la profilaxis antirretroviral	<b>17,975</b>

Cantidad de personas portadoras de VIH en todo el mundo	<b>33 millones</b>
Cantidad de personas muertas por causas relacionadas con el SIDA en 2007	<b>2 millones</b>
Nuevos casos de infección por día	<b>Cerca de 7,500</b>
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	<b>Cerca de 3 millones</b>
Esta enfermedad sigue siendo una importante causa de mortalidad para las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	<b>Tuberculosis</b>
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	<b>Cerca de 800,000</b>
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África subsahariana	<b>67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África subsahariana</b>
Porcentaje de los casos de infección por VIH a escala mundial que afecta a las mujeres	<b>50%</b>

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA EN

# NIGERIA

Número de habitantes	<b>148,000,000</b>
Número de habitantes de entre 15 y 49 años	<b>68,900,000</b>
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas	<b>50%</b>
Cantidad de personas portadoras de VIH	<b>2,600,000</b>
Cantidad de adultos de 15 años y más que son portadores de VIH	<b>2,400,000</b>
Cantidad de mujeres de 15 años y más que son portadoras de VIH	<b>1,400,000</b>
Porcentaje de prevalencia entre los adultos de 15 a 49 años	<b>3.1%</b>
Número de muertes causadas por el SIDA	<b>170,000</b>
Fondos públicos provenientes de fuentes nacionales destinados por los gobiernos al VIH y el SIDA	<b>10.8 (millones de USD)</b>
Estimación del número de personas que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>198,000</b>
Cantidad de niños de menos de 15 años que se informa que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>15,345</b>

Estimación del número de personas portadoras de VIH en el mundo	<b>33 millones</b>
Cantidad de personas muertas de SIDA en 2007	<b>2 millones</b>
Cantidad de nuevos casos de infección por VIH por día	<b>Cerca de 7,500</b>
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	<b>Cerca de 3 millones</b>
Principal causa de mortalidad entre las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	<b>Tuberculosis</b>
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	<b>Cerca de 800,000</b>
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África	<b>67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África</b>
Porcentaje de los casos de infección por el VIH que afecta a las mujeres	<b>50%</b>

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA EN

## BRASIL

Número de habitantes	<b>191,791,000</b>
Número de habitantes de entre 15 y 49 años	<b>104,714,000</b>
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas	<b>85%</b>
Cantidad de personas portadoras de VIH	<b>730,000</b>
Cantidad de adultos de 15 años y más que son portadores de VIH	<b>710,000</b>
Cantidad de mujeres de 15 años y más que son portadoras de VIH	<b>240,000</b>
Porcentaje de prevalencia entre los adultos de 15 a 49 años	<b>0.6%</b>
Número de muertes causadas por el SIDA	<b>15,000 (9,400 en 2001)</b>
Fondos públicos provenientes de fuentes nacionales destinados por los gobiernos al VIH y el SIDA	<b>562 (millones de USD)</b>
Estimación del número de personas que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>181,000 (154,000 en 2004)</b>
Cantidad de niños de menos de 15 años que se informa que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>6,815</b>

Estimación del número de personas portadoras de VIH en el mundo	<b>33 millones</b>
Cantidad de personas muertas de SIDA en 2007	<b>2 millones</b>
Cantidad de nuevos casos de infección por VIH por día	<b>Cerca de 7,500</b>
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	<b>Cerca de 3 millones</b>
Principal causa de mortalidad entre las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	<b>Tuberculosis</b>
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	<b>Cerca de 800,000</b>
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África	<b>67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África</b>
Porcentaje de los casos de infección por el VIH que afecta a las mujeres	<b>50%</b>

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA

## BURKINA FASO

Número de habitantes	14,784,000
Número de habitantes de entre 15 y 49 años	6,840
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas	19%
Cantidad de personas portadoras de VIH	130,000
Cantidad de adultos de 15 años y más que son portadores de VIH	120,000
Cantidad de mujeres de 15 años y más que son portadoras de VIH	61,000
Porcentaje de prevalencia entre los adultos de 15 a 49 años	1.6%
Número de muertes causadas por el SIDA	9,200 (10,000 en 2001)
Fondos públicos provenientes de fuentes nacionales destinados por los gobiernos al VIH y el SIDA	9.7 (millones de USD en 2006)
Estimación del número de personas que reciben un tratamiento antirretroviral	17,000 (3,000 en 2004)
Cantidad de niños de menos de 15 años que se informa que reciben un tratamiento antirretroviral	658

Estimación del número de personas portadoras de VIH en el mundo	33 millones
Cantidad de personas muertas de SIDA en 2007	2 millones
Cantidad de nuevos casos de infección por VIH por día	Cerca de 7,500
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	Cerca de 3 millones
Principal causa de mortalidad entre las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	Tuberculosis
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	Cerca de 800,000
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África	67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África
Porcentaje de los casos de infección por el VIH que afecta a las mujeres	50%

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA EN

## CHINA

Número de habitantes	<b>1,328,630,000</b>
Número de habitantes de entre 15 y 49 años	<b>751,043</b>
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas	<b>42%</b>
Cantidad de personas portadoras de VIH	<b>700,000</b>
Cantidad de adultos de 15 años y más que son portadores de VIH	<b>690,000</b>
Cantidad de mujeres de 15 años y más que son portadoras de VIH	<b>200,000</b>
Porcentaje de prevalencia entre los adultos de 15 a 49 años	<b>0.1%</b>
Número de muertes causadas por el SIDA	<b>39,000 (15,000 en 2001)</b>
Fondos públicos provenientes de fuentes nacionales destinados por los gobiernos al VIH y el SIDA	<b>124.1 (millones de USD)</b>
Estimación del número de personas que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>35,000 (9,000 en 2004)</b>
Cantidad de niños de menos de 15 años que se informa que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>766</b>

Estimación del número de personas portadoras de VIH en el mundo	<b>33 millones</b>
Cantidad de personas muertas de SIDA en 2007	<b>2 millones</b>
Cantidad de nuevos casos de infección por VIH por día	<b>Cerca de 7,500</b>
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	<b>Cerca de 3 millones</b>
Principal causa de mortalidad entre las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	<b>Tuberculosis</b>
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	<b>Cerca de 800,000</b>
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África	<b>67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África</b>
Porcentaje de los casos de infección por el VIH que afecta a las mujeres	<b>50%</b>

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA EN

## ESTONIA

Número de habitantes	<b>1,300,000</b>
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas (cifra para 2004)	<b>69%</b>
Cantidad de personas portadoras de VIH	<b>9,900</b>
Grupo etario más afectado por el VIH	<b>15 a 29 años</b>
Porcentaje de la cantidad total de estonios infectados por el VIH que son mujeres	<b>24% (20% en 2000)</b>
Porcentaje de la cantidad total de estonios infectados por el VIH que son hombres	<b>76% (80% en 2000)</b>
Número de muertes causadas por el SIDA	<b>500</b>
Cantidad de estonios a los que se les diagnosticó SIDA al 31 de diciembre de 2007	<b>191</b>

Estimación del número de personas portadoras de VIH en el mundo	<b>33 millones</b>
Cantidad de personas muertas de SIDA en 2007	<b>2 millones</b>
Cantidad de nuevos casos de infección por VIH por día	<b>Cerca de 7,500</b>
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	<b>Cerca de 3 millones</b>
Principal causa de mortalidad entre las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	<b>Tuberculosis</b>
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	<b>Cerca de 800,000</b>
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África	<b>67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África</b>
Porcentaje de los casos de infección por el VIH que afecta a las mujeres	<b>50%</b>

# CIFRAS CLAVE ACERCA DEL VIH Y EL SIDA EN

# MALÍ

Número de habitantes	<b>12,337,000</b>
Número de habitantes de entre 15 y 49 años	<b>5,420,000</b>
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas	<b>32%</b>
Cantidad de personas portadoras de VIH	<b>100,000</b>
Cantidad de adultos de 15 años y más que son portadores de VIH	<b>93,000</b>
Cantidad de mujeres de 15 años y más que son portadoras de VIH	<b>56,000</b>
Porcentaje de prevalencia entre los adultos de 15 a 49 años	<b>1.5%</b>
Número de muertes causadas por el SIDA	<b>5,800</b>
Fondos públicos provenientes de fuentes nacionales destinados por los gobiernos al VIH y el SIDA	<b>8.7 (millones de USD)</b>
Estimación del número de personas que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>12,000 (800 en 2004)</b>
Cantidad de niños de menos de 15 años que se informa que reciben un tratamiento antirretroviral	<b>579</b>

Estimación del número de personas portadoras de VIH en el mundo	<b>33 millones</b>
Cantidad de personas muertas de SIDA en 2007	<b>2 millones</b>
Cantidad de nuevos casos de infección por VIH por día	<b>Cerca de 7,500</b>
Cantidad de personas que reciben un tratamiento antirretroviral en los países de bajos y medianos ingresos	<b>Cerca de 3 millones</b>
Principal causa de mortalidad entre las personas portadoras de VIH en los países con bajos y medianos ingresos	<b>Tuberculosis</b>
Cantidad de personas en Europa occidental y central infectadas por el VIH	<b>Cerca de 800,000</b>
Porcentaje de la cantidad total de personas infectadas por el VIH en el mundo que viven en África	<b>67%, lo cual hace que el SIDA sea la principal causa de mortalidad en África</b>
Porcentaje de los casos de infección por el VIH que afecta a las mujeres	<b>50%</b>