

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA AU

NIGÉRIA

Nombre d'habitants	148,000,000
Nombre d'habitants âgés de 15 à 49 ans	68,900,000
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine	50%
Nombre de personnes vivant avec le VIH	2,600,000
Nombre d'adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	2,400,000
Nombre de femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	1,400,000
Taux de prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans	3.1 %
Nombre de décès dus au sida	170,000
Fonds publics consacrés au VIH et au sida par les gouvernements à partir de sources nationales	10.8 (millions d'USD)
Estimation du nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral	198,000
Nombre d'enfants de moins de 15 ans signalés comme bénéficiant d'un traitement antirétroviral	15,345

Estimation du nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH	33 millions
Nombre de personnes mortes du sida en 2007	2 millions
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH chaque jour	Près de 7,500
Nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral dans les pays à faible et à moyen revenu	Près de 3 millions
Principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et à moyen revenu	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
Pourcentage du nombre total de personnes infectées par le VIH dans le monde vivant en Afrique	67%, ce qui fait du sida la principale cause de mortalité en Afrique
Pourcentage des cas d'infection par le VIH touchant des femmes	50 %

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA AU

BRÉSIL

Nombre d'habitants	191,791,000
Nombre d'habitants âgés de 15 à 49 ans	104,714,000
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine	85 %
Nombre de personnes vivant avec le VIH	730,000
Nombre d'adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	710,000
Nombre de femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	240,000
Taux de prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans	0.6 %
Nombre de décès dus au sida	15,000 (9,400 en 2001)
Fonds publics consacrés au VIH et au sida par les gouvernements à partir de sources nationales	562 (millions d'USD)
Estimation du nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral	181,000 (154,000 en 2004)
Nombre d'enfants de moins de 15 ans signalés comme bénéficiant d'un traitement antirétroviral	6,815

Estimation du nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH	33 millions
Nombre de personnes mortes du sida en 2007	2 millions
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH chaque jour	Près de 7,500
Nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral dans les pays à faible et à moyen revenu	Près de 3 millions
Principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et à moyen revenu	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
Pourcentage du nombre total de personnes infectées par le VIH dans le monde vivant en Afrique	67 %, ce qui fait du sida la principale cause de mortalité en Afrique
Pourcentage des cas d'infection par le VIH touchant des femmes	50 %

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA AU

BURKINA FASO

Nombre d'habitants	14,784,000
Nombre d'habitants âgés de 15 à 49 ans	6,840
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine	19%
Nombre de personnes vivant avec le VIH	130,000
Nombre d'adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	120,000
Nombre de femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	61,000
Taux de prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans	1.6%
Nombre de décès dus au sida	9,200 (10,000 en 2001)
Fonds publics consacrés au VIH et au sida par les gouvernements à partir de sources nationales	9.7 (millions d'USD en 2006)
Estimation du nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral	17,000 (3,000 en 2004)
Nombre d'enfants de moins de 15 ans signalés comme bénéficiant d'un traitement antirétroviral	658

Estimation du nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH	33 millions
Nombre de personnes mortes du sida en 2007	2 millions
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH chaque jour	Près de 7,500
Nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral dans les pays à faible et à moyen revenu	Près de 3 millions
Principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et à moyen revenu	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
Pourcentage du nombre total de personnes infectées par le VIH dans le monde vivant en Afrique	67%, ce qui fait du sida la principale cause de mortalité en Afrique
Pourcentage des cas d'infection par le VIH touchant des femmes	50%

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA EN

CHINE

Nombre d'habitants	1,328,630,000
Nombre d'habitants âgés de 15 à 49 ans	751,043
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine	42 %
Nombre de personnes vivant avec le VIH	700,000
Nombre d'adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	690,000
Nombre de femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	200,000
Taux de prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans	0.1 %
Nombre de décès dus au sida	39,000 (15,000 en 2001)
Fonds publics consacrés au VIH et au sida par les gouvernements à partir de sources nationales	124.1 (millions d'USD)
Estimation du nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral	35,000 (9,000 en 2004)
Nombre d'enfants de moins de 15 ans signalés comme bénéficiant d'un traitement antirétroviral	766

Estimation du nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH	33 millions
Nombre de personnes mortes du sida en 2007	2 millions
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH chaque jour	Près de 7,500
Nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral dans les pays à faible et à moyen revenu	Près de 3 millions
Principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et à moyen revenu	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
Pourcentage du nombre total de personnes infectées par le VIH dans le monde vivant en Afrique	67 %, ce qui fait du sida la principale cause de mortalité en Afrique
Pourcentage des cas d'infection par le VIH touchant des femmes	50 %

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA EN

ESTONIE

Nombre d'habitants	1,300,000
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine (chiffre pour 2004)	69%
Nombre de personnes vivant avec le VIH	9,900
Groupe d'âge le plus touché par le VIH	15-29 ans
Pourcentage du nombre total d'infections par le VIH en Estonie touchant des femmes	24% (20% en 2000)
Pourcentage du nombre total d'infections par le VIH en Estonie touchant des hommes	76% (80% en 2000)
Nombre de décès dus au sida	500
Nombre d'Estoniens diagnostiqués comme étant atteints du sida, au 31 décembre 2007	191

Estimation du nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH	33 millions
Nombre de personnes mortes du sida en 2007	2 millions
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH chaque jour	Près de 7,500
Nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral ans les pays à faible et à moyen revenu	Près de 3 millions
Principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et à moyen revenu	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
Pourcentage du nombre total de personnes infectées par le VIH dans le monde vivant en Afrique	67%, ce qui fait du sida la principale cause de mortalité en Afrique
Pourcentage des cas d'infection par le VIH touchant des femmes	50%

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA AU

MALI

Nombre d'habitants	12,337,000
Nombre d'habitants âgés de 15 à 49 ans	5,420,000
Pourcentage de la population vivant en zone urbaine	32 %
Nombre de personnes vivant avec le VIH	100,000
Nombre d'adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	93,000
Nombre de femmes de 15 ans et plus vivant avec le VIH	56,000
Taux de prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans	1.5 %
Nombre de décès dus au sida	5,800
Fonds publics consacrés au VIH et au sida par les gouvernements à partir de sources nationales (chiffre pour 2006)	8.7 (millions d'USD)
Estimation du nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral	12,000 (800 en 2004)
Nombre d'enfants de moins de 15 ans signalés comme bénéficiant d'un traitement antirétroviral	579

Estimation du nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH	33 millions
Nombre de personnes mortes du sida en 2007	2 millions
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH chaque jour	Près de 7,500
Nombre de personnes bénéficiant d'un traitement antirétroviral dans les pays à faible et à moyen revenu	Près de 3 millions
Principale cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et à moyen revenu	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
Pourcentage du nombre total de personnes infectées par le VIH dans le monde vivant en Afrique	67 %, ce qui fait du sida la principale cause de mortalité en Afrique
Pourcentage des cas d'infection par le VIH touchant des femmes	50 %

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE VIH ET LE SIDA AU

CAMEROUN

Population	18,500,000
Pourcentage de la population représentée par la tranche d'âge 0 à 14 ans	42.8 %
Taux de séroprévalence dans la population générale (2004)	5.5 %
Ratio d'infection entre femmes et hommes	1:7
Nombre de personnes testées en 2008	590,325 ou 39 % de l'objectif fixé
Des 590 325 personnes testées, nombre étant séropositifs	64,930 ou 11,5 %
Pourcentage des femmes enceintes étant séropositives	6.51 %
Nombre de femmes enceintes séropositives ayant reçu la prophylaxie antirétrovirale pour réduire la transmission de la mère à l'enfant	10,114 (contre 6,213 en 2007)
Nombre d'enfants nés de mères séropositives et ayant reçu la prophylaxie antirétrovirale	17,975

Nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde entier	33 millions
Nombre de personnes mortes de causes liées au sida en 2007	2 millions
Nouveaux cas d'infection par jour	Près de 7,500
Nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible et intermédiaire	Près de 3 millions
Cette maladie reste une importante cause de décès pour les personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire.	Tuberculose
Nombre de personnes en Europe occidentale et centrale infectées par le VIH	Près de 800,000
De toutes les personnes infectées par le VIH dans le monde, pourcentage vivant en Afrique subsaharienne	67 %, faisant du sida la principale cause de décès en Afrique subsaharienne
Pourcentage des infections au VIH à l'échelle mondiale touchant les femmes	50 %