

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

КАМЕРУНЕ

Население	18,500,000
Процент населения, представленный по возрастным группам 0 - 14 лет	42.8%
Процент доминирования серотипа среди общего населения (2004 г.)	5.5%
Коэффициент заражения среди женщин и мужчин	1:7
Число лиц, протестированных в 2008 г.	590,325 или 39% установленного показателя
Из 590 325 протестированных количество «ВИЧ- серопозитивных»	64,930 или 11.5%
Процент «ВИЧ- серопозитивных» беременных женщин	6.51%
Количество «ВИЧ- серопозитивных» беременных женщин, прошедших антиретровирусный курс лечения для уменьшения риска передачи от матери к ребенку	10,114 (против 6,213 в 2007 г.)
Количество детей, родившихся от «ВИЧ- серопозитивных» матерей и прошедших антиретровирусный курс лечения	17,975

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулёз
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных в мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

НИГЕРИИ

Население страны	148,000,000
Население в возрасте 15-49 лет	68,900,000
Процент городского населения	50%
Общее количество ВИЧ-инфицированных	2,600,000
Количество ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 лет	2,400,000
Количество ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте от 15	1,400,000
Коэффициент распространённости болезни среди взрослых от 15 до 49 лет	3.1%
Смертность от СПИДа	170,000
Государственные средства из внутренних источников, израсходованные правительством на борьбу с ВИЧ/СПИД	10.8 (миллионов долларов США)
Приближенное количество людей, получающих антиретровирусное лечение	198,000
Зарегистрированное количество детей в возрасте до 15 лет, получающих антиретровирусное лечение	15,345

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулёз
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных во всем мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

БРАЗИЛИИ

Население страны	191,791,000
Население в возрасте 15-49 лет	104,714,000
Процент городского населения	85%
Общее количество ВИЧ-инфицированных	730,000
Количество ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 лет	710,000
Количество ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте от 15 лет	240,000
Коэффициент распространённости болезни среди взрослых от 15 до 49 лет	0.6%
Смертность от СПИДа	15,000 (9,400 в 2001)
Государственные средства из внутренних источников, израсходованные правительством на борьбу с ВИЧ/СПИД	562 (миллиона долларов США)
Приближенная численность людей, получающих антиретровирусное лечение	181,000 (154,000 в 2004)
Зарегистрированное количество детей в возрасте до 15 лет, получающих антиретровирусное лечение	6,815

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулёз
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных в мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

БУРКИНА-ФАСО

Население страны	14,784,000
Население в возрасте 15-49 лет	6,840
Процент городского населения	19%
Общее количество ВИЧ-инфицированных	130,000
Количество ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 лет	120,000
Количество ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте от 15 лет	61,000
Коэффициент распространённости болезни среди взрослых от 15 до 49 лет	1.6%
Смертность от СПИДа	9,200 (10,000 в 2001)
Государственные средства из внутренних источников, израсходованные правительством на борьбу с ВИЧ/СПИД	9.7 (миллионов долларов США в 2006)
Приближенная численность людей, получающих антиретровирусное лечение	17,000 (3,000 в 2004)
Зарегистрированное количество детей в возрасте до 15 лет, получающих антиретровирусное лечение	658

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулез
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных в мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

КИТАЕ

Население страны	1,328,630,000
Население в возрасте 15-49 лет	751,043
Процент городского населения	42%
Общее количество ВИЧ-инфицированных	700,000
Количество ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 лет	690,000
Количество ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте от 15 лет	200,000
Коэффициент распространённости болезни среди взрослых от 15 до 49 лет	0.1%
Смертность от СПИДа	39,000 (15,000 в 2001)
Государственные средства из внутренних источников, израсходованные правительством на борьбу с ВИЧ/СПИД	124.1 (млн.долларов США)
Приближенная численность людей, получающих антиретровирусное лечение	35,000 (9,000 в 2004)
Зарегистрированное количество детей в возрасте до 15 лет, получающих антиретровирусное лечение	766

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулёз
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных в мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

ЭСТОНИИ

Население страны	1,300,000
Процент городского населения (цифра 2004 г.)	69%
Количество ВИЧ-инфицированных	9,900
Возрастная группа, наиболее подверженная заражению ВИЧ-инфекцией	15 – 29 лет
Процентная доля женщин из всех ВИЧ-инфицированных в Эстонии	24% (20% в 2000)
Процентная доля мужчин из всех ВИЧ-инфицированных в Эстонии	76% (80% в 2000)
Смертность от СПИДа	500
Количество эстонцев с диагнозом СПИД по состоянию на 31 декабря 2007 г.	191

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулёз
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных в мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ВИЧ/СПИД В

МАЛИ

Население страны	12,337,000
Население в возрасте 15-49 лет	5,420,000
Процент городского населения	32%
Общее количество ВИЧ-инфицированных	100,000
Количество ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 лет	93,000
Количество ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте от 15	56,000
Коэффициент распространённости болезни среди взрослых от 15 до 49 лет	1.5%
Смертность от СПИДа	5,800
Государственные средства из внутренних источников, израсходованные правительством на борьбу с ВИЧ/СПИД	8.7 (миллионов долларов США)
Приближенное количество людей, получающих антиретровирусное лечение	12,000 (800 в 2004)
Зарегистрированное количество детей в возрасте до 15 лет, получающих антиретровирусное лечение	579

Приближенная численность ВИЧ-инфицированных жителей на планете	33 миллиона
Количество умерших от СПИДа в 2007 г.	2 миллиона
Количество ежедневно регистрируемых новых ВИЧ-инфицированных	Около 7,500
Количество людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем дохода	Почти 3 миллиона
Основная причина смертности ВИЧ-инфицированных в странах с низким и средним уровнем дохода.	Туберкулёз
Количество ВИЧ-инфицированных в странах Западной и Центральной Европы	Около 800,000
Доля ВИЧ-инфицированных во всем мире, проживающих в Африке	67%, вследствие чего СПИД – основная причина смертности в Африке
Доля ВИЧ-инфицированных женщин в мировом масштабе	50%