



L'essentiel par région – Le point sur l'épidémie de sida 2007

Vue d'ensemble

- La prévalence mondiale du VIH (la proportion de personnes vivant avec le virus) semble s'être stabilisée. Toutefois, le nombre de personnes vivant avec le VIH a passé de 29,0 millions [26,9-32,4 millions] en 2001 à 33,2 millions [30,6-36,1 millions] en 2007.
- Quelque 2,5 millions [1,8-4,1 millions] de personnes ont été nouvellement infectées par le virus en 2007 et 2,1 millions [1,9-2,4 millions] de personnes sont mortes de maladies liées au sida.

Afrique subsaharienne

- L'**Afrique subsaharienne** reste la région la plus affectée. Environ 1,7 million [1,4-2,4 millions] de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en 2007, portant à 22,5 millions [20,9-24,3 millions] le nombre total de personnes vivant avec le virus. Contrairement à d'autres régions, la majorité des personnes (61%) vivant avec le VIH en **Afrique subsaharienne** sont des femmes.
 - Plus des deux tiers (68%) de toutes les personnes infectées par le VIH vivent en **Afrique subsaharienne**, où sont survenus plus des trois quarts (76%) de tous les décès liés au sida en 2007.
 - Au sein de la région, l'**Afrique australe** est la plus sévèrement touchée – la prévalence nationale du VIH chez les adultes a dépassé 15% dans huit pays d'**Afrique australe** en 2005¹.
 - L'**Afrique du Sud** est le pays du monde qui compte le plus d'infections à VIH, mais comme dans la plupart des pays d'**Afrique australe**, d'**Afrique de l'Est** et d'**Afrique de l'Ouest**, la prévalence du VIH chez les adultes est stable ou a commencé à décliner. Cette dernière tendance est surtout évidente au **Kenya** et au **Zimbabwe**, et des signes de déclin de la prévalence du VIH sont également constatés en **Côte d'Ivoire**, au **Mali** et dans les zones urbaines du **Burkina Faso**. Dans ces pays, on a des preuves d'une évolution vers des comportements plus sûrs.

Asie

- En 2007, on estime à 4,9 millions [3,7-6,7 millions] le nombre de personnes qui en **Asie** vivaient avec le VIH, notamment les 440 000 [210 000-1,0 million] personnes nouvellement infectées au cours de l'année écoulée. Approximativement 300 000 personnes [250 000-470 000] sont décédées de maladies liées au sida en 2007.

¹ Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

- En **Asie de l'Est**, il y a eu près de 20% de nouvelles infections de plus en 2007 qu'en 2001.
- La prévalence du VIH est la plus élevée en **Asie du Sud-Est**, avec une importante variation des tendances de l'épidémie entre différents pays – on observe un déclin de la prévalence au **Cambodge**, au **Myanmar** et en **Thaïlande**, mais l'épidémie croît à un taux particulièrement élevé en **Indonésie** et au **Viet Nam**.
- La proportion des personnes vivant avec le VIH en **Inde** est plus faible qu'elle ne l'avait été estimée précédemment, mais l'épidémie continue d'affecter de grands nombres de personnes (2,5 millions [2,0-3,1 millions] en 2006).

Caraïbes

- En 2007, la prévalence du VIH chez les adultes a été estimée à 1% dans les **Caraïbes**, qui restent la deuxième région la plus touchée du monde après l'Afrique subsaharienne. Quelque 230 000 [210 000-270 000] personnes vivaient avec le VIH en 2007, et quelque 11 000 [9800-18 000] personnes sont décédées de maladies liées au sida. En outre, cette même année, 17 000 [15 000-23 000] personnes ont été nouvellement infectées par le VIH.
 - C'est en **République dominicaine** et en **Haïti** que la prévalence du VIH est la plus élevée. Ensemble, ils représentent près des trois quarts de toutes les personnes vivant avec le VIH dans les **Caraïbes**.
 - En **Haïti**, toutefois, les données indiquent de récentes diminutions de certains types de comportements sexuels qui exposent les gens à un risque plus élevé d'infection par le VIH.
 - Dans les **Caraïbes**, le sida reste l'une des principales causes de décès parmi les personnes âgées de 25 à 44 ans.

Europe orientale et Asie centrale

- Le nombre de personnes vivant avec le VIH en **Europe orientale** et en **Asie centrale** s'est accru en 2007, atteignant 1,6 million [1,2-2,1 millions], selon les estimations, avec quelque 150 000 [70 000-290 000] nouvelles infections à VIH. Dans la région, quelque 55 000 [42 000-88 000] personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2007.
 - Près de 90% des diagnostics de VIH nouvellement signalés dans cette région ont été enregistrés dans deux pays, la **Fédération de Russie** (66%) et l'**Ukraine** (21%), mais les diagnostics de VIH nouvellement rapportés sont à la hausse dans d'autres pays, notamment l'**Ouzbékistan**, qui a aujourd'hui la plus vaste épidémie d'**Asie centrale**.
 - La consommation de drogues injectables est un facteur majeur de l'épidémie dans la région.

Amérique latine

- En règle générale, les épidémies de l'**Amérique latine** restent stables. Le nombre estimé des nouvelles infections en **Amérique latine** en 2007 était de 100 000 [47 000-220 000], ce qui porte à 1,6 million [1,4-1,9 million] le nombre total de personnes vivant avec le VIH dans cette région. On estime à 58 000 [49 000-91 000] le nombre de personnes qui sont décédées de maladies liées au VIH au cours de l'année écoulée.
 - La transmission du VIH se poursuit parmi les populations les plus exposées au risque, notamment les professionnel(le)s du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

- Les rapports sexuels non protégés entre hommes représentent un important facteur de risque dans plusieurs épidémies de la région².
- La stigmatisation et la discrimination très répandues entravent les efforts visant à réaliser l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui dans la région.
- Des d'investissements accrus s'imposent pour améliorer une surveillance inadéquate en Amérique latine.

Amérique du Nord, Europe occidentale et Europe centrale

- Globalement, environ 2,1 millions [1,1-3,0 millions] de personnes en **Amérique du Nord** et en **Europe occidentale** et **Europe centrale** vivaient avec le VIH en 2007, notamment les 78 000 [19 000-86 000] personnes qui ont été infectées par le VIH au cours de l'année écoulée. Quelque 32 000 [20 000-84 000] personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2007.
 - Il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics de VIH en **Europe occidentale** depuis 2002, et un nombre relativement stable de nouvelles infections à VIH chaque année en **Amérique du Nord**.
 - Un large accès à des traitements antirétroviraux efficaces a contribué à maintenir les décès liés au sida dans cette région à un niveau relativement faible.

Moyen-Orient et Afrique du Nord

- On estime à 35 000 [16 000-65 000] le nombre de personnes dans la région qui ont été infectées par le VIH en 2007, ce qui porte à 380 000 [270 000-500 000] le nombre total de personnes vivant avec le VIH. On estime que 25 000 [20 000-34 000] personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2007.
 - Peu de données sont disponibles dans la région, et il faut en faire bien davantage pour améliorer la surveillance et la collecte des données.
 - La plupart des infections à VIH surviennent parmi les hommes et dans les zones urbaines, à l'exception du **Soudan**, pays où la prévalence est la plus élevée de la région, et où les rapports hétérosexuels non protégés représentent le plus important facteur pour l'infection à VIH.
 - Les rapports sexuels sans protection sont un élément clé des épidémies de VIH à travers toute la région, mais la consommation de drogues injectables est le principal mode de transmission du VIH dans de nombreux pays.

Océanie

- On estime à 14 000 [11 000-26 000] le nombre de personnes qui ont été infectées par le VIH en **Océanie** en 2007, ce qui porte à 75 000 [53 000-120 000] le nombre total de personnes vivant avec le virus dans cette région. En 2007, quelque 1200 [<500-2700] personnes sont décédées de maladies liées au sida en **Océanie**.
 - Plus de 70% du nombre total des personnes vivant avec le virus se trouvent en **Papouasie-Nouvelle-Guinée**, où l'épidémie s'étend toujours, mais à des niveaux légèrement plus faibles qu'on ne le pensait auparavant.
 - En **Australie** et en **Nouvelle-Zélande**, le VIH continue de se transmettre principalement par le biais des rapports sexuels non protégés entre hommes.

² Bolivie, Chili, Equateur et Pérou en Amérique du Sud, et El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua et Panama en Amérique centrale.

Contact

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Genève | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org

L'ONUSIDA est une initiative conjointe innovante des Nations Unies, qui rassemble les efforts et les ressources du Secrétariat de l'ONUSIDA et de 10 organisations du système des Nations Unies dans la riposte au sida. Le Siège du Secrétariat se trouve à Genève (Suisse), avec du personnel sur le terrain dans plus de 80 pays. L'action cohérente du système des Nations Unies sur le sida est coordonnée dans les pays par le biais des groupes thématiques des Nations Unies et de programmes communs sur le sida. Les Coparrainants de l'ONUSIDA sont les suivants : le HCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, l'UNFPA, l'ONUSIDA, l'OIT, l'UNESCO, l'OMS et la Banque mondiale. Vous pouvez consulter le site web de l'ONUSIDA sur www.unaids.org