

Информационный бюллетень

11

07

Основные факты по регионам: Развитие эпидемии СПИДа, 2007 г.

Глобальный обзор

- Глобальный показатель распространенности ВИЧ (пропорция людей, живущих с вирусом), вероятно, стабилизировался. Однако число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 29,0 [26,9-32,4] миллиона человек в 2001 году до 33,2 [30,6-36,1] миллиона человек в 2007 году.
- В 2007 году число людей, заразившихся ВИЧ, составило около 2,5 [1,8-4,1] миллиона человек, и 2,1 [1,9-2,4] миллиона человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

Африка к югу от Сахары

- **Африка к югу от Сахары** остается наиболее затронутым регионом. В 2007 году ВИЧ заразились около 1,7 [1,4-2,4] миллиона человек, в результате чего общее число людей, живущих с вирусом, достигло 22,5 [20,9-24,3] миллиона человек. В отличие от других регионов, большинство (61%) людей, живущих с вирусом в **Африке к югу от Сахары**, составляют женщины.
 - Более двух третей (68%) всех ВИЧ-инфицированных проживают в **Африке к югу от Сахары**, где в 2007 году зарегистрировано более трех четвертей (76%) всех случаев смерти в связи со СПИДом.
 - Самым затронутым регионом **Африки** является **южный регион**, где в 2005 году национальный показатель распространенности ВИЧ превысил 15% в восьми странах¹.
 - Самое больше число ВИЧ-инфекций отмечено в **Южной Африке**, однако, как и в большинстве стран на **юге, востоке и западе Африки**, показатель распространенности ВИЧ среди взрослых либо является стабильным, либо начал уменьшаться. Эта последняя тенденция наиболее заметна в **Зимбабве** и **Кении**; признаки уменьшения показателя распространенности ВИЧ также наблюдаются в **Кот-д'Ивуаре**, **Мали** и городских районах **Буркина-Фасо**. В этих странах также имеются данные об изменении поведения в сторону более безопасного.

Азия

- В 2007 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ в **Азии**, составляло 4,9 [3,7-6,7] миллиона человек, включая 440 000 [210 000-1,0 миллиона] человек,

¹ Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Свазиленд и Южная Африка.

заразившихся в прошлом году. В 2007 году от болезней, обусловленных СПИДом, умерло около 300 000 [250 000–470 000] человек.

- В 2007 году число новых ВИЧ-инфекций в **Восточной Азии** было почти на 20% больше чем в 2001 году.
- Самый высокий показатель распространенности ВИЧ отмечен в **Юго-Восточной Азии**, причем тенденции в развитии эпидемии сильно варьируются в зависимости от страны: в **Камбодже, Мьянме и Таиланде** показатель распространенности ВИЧ снижается, в то же время во **Вьетнаме и Индонезии** эпидемия нарастает особенно сильными темпами.
- Несмотря на то что пропорция людей, живущих с ВИЧ в **Индии**, ниже по сравнению с предыдущими оценками, эпидемия по-прежнему затрагивает большое число людей (в 2006 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 2,5 [2-3,1] миллиона человек).

Карибский бассейн

- По оценкам, в 2007 году показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения в **Карибском бассейне** составлял 1%, и он остается вторым наиболее затронутым регионом мира после Африки к югу от Сахары. В 2007 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 230 000 [210 000-270 000] человек, а от болезней, обусловленных СПИДом, умерли около 11 000 [9 800-18 000] человек. Кроме того, 17 000 [15 000-23 000] человек заразились ВИЧ.
 - Самый высокий показатель распространенности ВИЧ отмечен в **Доминиканской Республике и Гаити**, на которые приходится около трех четвертей всех людей, живущих с ВИЧ в **Карибском бассейне**.
 - В то же время в **Гаити** полученные данные указывают на значительное снижение в последнее время некоторых форм сексуального поведения, которые повышают риск заражения ВИЧ.
 - В **Карибском бассейне** СПИД остается одной из ведущих причин смерти среди людей в возрасте от 25 до 44 лет.

Восточная Европа и Центральная Азия

- По оценкам, в 2007 году число людей, живущих с ВИЧ, в **Восточной Европе и Центральной Азии**, увеличилось до 1,6 [1,2 -2,1] миллиона человек, а оценочное число новых ВИЧ-инфекций составило 150 000 [70 000-290 000]. В 2007 году в этом регионе около 55 000 [42 000-88 000] человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.
 - В этом регионе около 90% новых диагнозов ВИЧ зарегистрировано в двух странах – **Российской Федерации** (66%) и **Украине** (21%); в то же время число новых ВИЧ-инфекций растет в других странах, включая **Узбекистан**, где сейчас развивается самая крупная эпидемия в **Центральной Азии**.
 - Одним из основных факторов в развитии эпидемии в регионе является употребление инъекционных наркотиков.

Латинская Америка

- Эпидемии ВИЧ в **Латинской Америке** остаются в целом стабильными. В 2007 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций в **Латинской Америке** составило 100 000

[47 000–220 000], в результате чего общее число людей, живущих с ВИЧ в регионе, достигло 1,6 [1,4–1,9] миллиона человек. По оценкам, в прошлом году от заболеваний, связанных со СПИДом, умерли 58 000 [49 000–91 000] человек.

- ВИЧ по-прежнему передается среди групп населения с повышенным риском заражения, включая работников секс-бизнеса и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- Незащищенные половые контакты между мужчинами представляют собой важный фактор в развитии эпидемий в регионе.²
- Широко распространенная стигма и дискриминация сдерживают усилия, направленные на обеспечение всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ в этом регионе.
- Для решения проблемы неадекватности эпиднадзора в Латинской Америке требуются новые инвестиции.

Северная Америка, Западная и Центральная Европа

- В целом, в 2007 году число людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке, Западной и Центральной Европе, составило примерно 2,1 [1,1–3,0] миллиона человек, включая 78 000 [19 000–86 000] человек, заразившихся ВИЧ в прошлом году. В 2007 году от СПИДа умерли около 32 000 [20 000–84 000] человек.
 - Число новых диагнозов ВИЧ в Западной Европе с 2002 года увеличивалось, а число новых ВИЧ-инфекций, регистрируемых ежегодно в Северной Америке, оставалось относительно устойчивым.
 - Благодаря широкому доступу к антиретровирусному лечению число случаев смерти в связи со СПИДом в этом регионе остается сравнительно небольшим.

Ближний Восток и Северная Африка

- В 2007 году, по оценкам, в этом регионе ВИЧ заразились около 35 000 [16 000–65 000] человек, в результате чего общее число людей, живущих с ВИЧ, составило 380 000 [270 000–500 000] человек. По оценкам, в 2007 году от болезней, обусловленных СПИДом, умерли 25 000 [20 000–34 000] человек.
 - Данные в этом регионе ограничены; необходимы значительные усилия для улучшения систем эпиднадзора и сбора данных.
 - Большинство случаев ВИЧ-инфекции имеет место среди мужчин и в городских районах, за исключением **Судана**, где отмечен самый высокий показатель распространенности в регионе и где самым важным фактором риска заражения ВИЧ являются небезопасные гетеросексуальные связи.
 - В то время как незащищенный коммерческий секс является одним из основных факторов в развитии эпидемий ВИЧ по всему региону, основным путем передачи ВИЧ во многих странах является употребление наркотиков.

Океания

² Боливия, Перу, Чили и Эквадор в Южной Америке, а также Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама и Сальвадор в Центральной Америке.

- По оценкам, число людей, заразившихся ВИЧ в 2007 году в **Океании**, составило 14 000 [11 000–26 000] человек, вследствие чего общее число людей, живущих с этим вирусом в данном регионе, достигло 75 000 [53 000–120 000] человек. В 2007 году в Океании от заболеваний, связанных со СПИДом, умерли около 1200 [<500-2700] человек.
 - Более 70% от общего числа людей, живущих с ВИЧ, проживают в **Папуа – Новой Гвинее**, где эпидемия по-прежнему растет, хотя и несколько более низкими темпами, чем это считалось ранее.
 - В **Австралии** и **Новой Зеландии** ВИЧ по-прежнему передается главным образом через незащищенные половые контакты между мужчинами.

Лицо для контактов

Софи Бартон-Нотт | ЮНЭЙДС, Женева | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org

ЮНЭЙДС представляет собой инновационную совместную программу Организации Объединенных Наций, объединяющую усилия и ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и десяти учреждений ООН в рамках усилий в ответ на СПИД. Штаб-квартира Секретариата находится в Женеве, Швейцария; сотрудники ЮНЭЙДС работают более чем в 80 странах. Согласованные действия системы ООН по СПИДу в странах координируются тематическими группами ООН и совместными программами по СПИДу. Коспонсорами ЮНЭЙДС являются УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк. Посетите веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org