

Источник: Развитие эпидемии СПИДа - декабрь 2006 г.

Латинская Америка

Общий обзор

- Хотя в некоторых странах Латинской Америки модели эпидемии ВИЧ меняются, эпидемия в этом регионе остается, в целом, стабильной, и в 2006 году общее число новых ВИЧ-инфекций составило 140 000 человек, и приблизительно 65 000 человек умерли от СПИДа.
- Две третьих от оценочного числа в 1,7 миллиона человек, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, проживают в четырех крупнейших странах: **Бразилии, Мексике, Колумбии и Аргентине.**
- Однако, по оценкам, наиболее высокие уровни распространенности наблюдаются в странах меньшего размера в Центральной Америке, где в 2005 году они составляли чуть менее 1% в **Сальвадоре, Гватемале и Панаме**, 1,5% в **Гондурасе** и 2,5% в **Белизе.**
- Передача ВИЧ обусловлена факторами, общими для большинства стран Латинской Америки: широко распространенной бедностью и миграцией, недостаточной информацией о тенденциях эпидемии за пределами крупных городов и гомофобией.
- Вследствие незащищенного секса между мужчинами произошло 25%-35% зарегистрированных случаев СПИДа в таких странах, как **Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала и Перу.**
- Уровни ВИЧ-инфекции среди работниц секс-бизнеса очень сильно различаются. Распространенность ВИЧ очень низка в некоторых странах Южной Америки, например, в **Чили** и **Венесуэле**, между тем, среди коммерческих секс-работников в городах **Аргентины** были обнаружены показатели распространенности от 2,8% до 6,3%, а в некоторых частях **Бразилии** был зарегистрирован уровень 6%.

Положение в странах

- В **Бразилии** в 2005 году проживало 620 000 человек, живущих с ВИЧ, – это одна треть всех людей, живущих с вирусом в Латинской Америке.
- Хотя процент сексуально активных молодых людей в **Бразилии** мало изменился с 1998 по 2005 гг., уровень использования презервативов вырос очень значительно – более чем на треть среди мужчин и женщин в возрасте 15-24 лет. За тот же период уровень использования презервативов среди бразильцев всех возрастов вырос почти на 50%.
- Незащищенный секс между мужчинами остается серьезным фактором передачи ВИЧ – на него в **Бразилии** приходится до половины ВИЧ-инфекций, передающихся половым путем, причем заражается все большее число женщин.
- По оценкам, одна треть взрослого населения **Бразилии** прошла тестирование на ВИЧ (большинство из них – женщины в возрасте 25-39 лет), и примерно каждый третий ВИЧ-инфицированный бразилец знает свой ВИЧ-статус.
- Обеспечение антиретровирусными препаратами в **Бразилии** является одним из лучших в мире, и это приносит положительные результаты. На национальном уровне передача ВИЧ от матери ребенку существенно снизилась – с 16% в 1997

году до менее 4% в 2002 году. Уровень смертности от СПИДа снизился на 50% в период с 1996 по 2002 годы, а число госпитализаций в связи со СПИДом сократилось за тот же период на 80%.

- В 2005 году в **Аргентине** национальные показатели распространенности среди взрослого населения составляли, по оценкам, 0,6%. Большинство из оценочного числа в 130 000 людей, живущих с ВИЧ, проживают в провинциях Буэнос-Айрес, Кордоба и Санта-Фе. По данным различных исследований, до 44% потребителей инъекционных наркотиков, 7%-15% мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, и 6% женщин секс-бизнеса инфицированы ВИЧ. Более четверти (28%) заключенных в некоторых городских тюрьмах получили положительные результаты тестирования на ВИЧ. Вследствие сочетания разных факторов (включая дальнейшее развитие эпидемии и последствия экономического кризиса 2001 года) незащищенный секс стал в последние годы основным путем передачи ВИЧ.
- Примерно 9600 человек жили с ВИЧ к концу 2005 года в **Уругвае**, где основным путем передачи ВИЧ являются незащищенные половые отношения (в основном гетеросексуальные). Тем не менее, уровни инфекции очень высоки среди некоторых групп в столице страны, Монтевидео: 22% среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, 19% среди потребителей инъекционных наркотиков и 10% среди потребителей неинъекционных наркотиков. Как минимум, половина людей в **Уругвае**, нуждающихся в антиретровирусном лечении, получали его к середине 2006 года.
- Эпидемия в **Парагвае** находится на том же уровне – около 13 000 человек жили с ВИЧ в этой стране к концу 2005 года. Большинство случаев ВИЧ-инфекции приходится на мужчин (74%), а основными путями передачи являются использование нестерильного инъекционного инструментария для потребления наркотиков и незащищенный секс между мужчинами.
- Незащищенный секс, особенно между мужчинами, является основным фактором риска ВИЧ-инфекции в **Чили**, где около 28 000 человек жили с ВИЧ к концу 2005 года. Растет число женщин, которые заражаются ВИЧ, многие из них – от партнеров-мужчин, инфицированных вследствие незащищенного секса с другими мужчинами.
- В **Перу** ВИЧ-инфекция, в основном, поражает мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. Распространенность ВИЧ в этой группе населения высока – 10% в г. Икитос и прилегающих районах, и в среднем 14% в шести других городах, включая столицу, Лиму, где положительные результаты тестирования на ВИЧ получили до 23% мужчин, занимающихся сексом с мужчинами.
- Секс между мужчинами также является основным фактором риска в других странах Андского региона, включая **Боливию** (распространенность ВИЧ на уровне 24% среди MSM была обнаружена в г. Санта-Крус), **Эквадор** (распространенность ВИЧ на уровне 28% в Гуаякиле и 15% в Кито) и **Колумбию** (распространенность ВИЧ на уровне 20% в Боготе). Ни в одной из этих трех стран распространенность ВИЧ среди женщин секс-бизнеса не превышает 4%, а в нескольких городах она составляет значительно менее 1%.
- Наличие большого населения в **Мексике** означает, что, несмотря на низкую национальную распространенность ВИЧ среди взрослого населения – по оценкам, составляющую 0,3%, в стране в 2005 году 180 000 человек жило с ВИЧ. Эпидемия в Мексике, в основном, сконцентрирована среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, работников секс-бизнеса и их клиентов и потребителей инъекционных наркотиков. Предположительно, секс между мужчинами стал причиной более половины (57%) ВИЧ-инфекций, зарегистрированных на сегодняшний день.

Контактные лица:

Ясмин Топор | ЮНЭЙДС Женева | тел. +41 22 791 3501 | topory@unaids.org

Софи Бартон-Нотт | ЮНЭЙДС Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org