



Oriente Medio y África del Norte

Panorama

- Se estima que 68 000 personas contrajeron el VIH en 2006, lo que eleva a 460 000 el número total de personas que viven con el virus en la región. Alrededor de 36 000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA en Oriente Medio y África del Norte en 2006.
- La mayoría de las infecciones por el VIH comunicadas correspondió a varones, pero está creciendo la proporción de mujeres infectadas.
- Los sistemas desiguales (y, en muchos casos, insuficientes) de vigilancia del VIH dificultan la calibración precisa de las características y tendencias de las epidemias en muchos países de esta región, especialmente entre los grupos de máximo riesgo, como los consumidores de drogas intravenosas, los profesionales del sexo y los varones que tienen relaciones sexuales con varones.
- La mejor recopilación de datos en algunos países (como **Argelia, Irán, Libia y Marruecos**) revela la existencia de epidemias localizadas de VIH en toda la región, mientras que persiste una epidemia generalizada en el **Sudán**.
- Se estima que en la región hay unas 75 000 personas que necesitan tratamiento antirretrovírico, pero sólo 4000 lo estaban recibiendo a final de 2005.

Situación en los países

- El **Sudán** tiene –y con diferencia– la mayor epidemia de SIDA de la región. La prevalencia del VIH en adultos era del 1,6% en 2005, y había unas 350 000 personas que vivían con el VIH. El conocimiento sobre la epidemia era mínimo: sólo del 2% de los hombres sabía que los preservativos pueden prevenir la transmisión del virus. Según un estudio, la prevalencia del VIH ascendía al 9,3% entre varones que tenían relaciones sexuales con varones en el estado de Jartum.
- Se han encontrado niveles elevados de infección por el VIH entre los 137 000 consumidores de drogas intravenosas que se estima que hay en el **Irán**. Se comprobó que estaban infectados por el VIH casi uno de cada cuatro (23%) consumidores de drogas intravenosas que participaron en un reciente estudio en la capital, Teherán.
- Diversos estudios demuestran que han utilizado jeringas no estériles hasta cuatro de cada diez consumidores de drogas en **Argelia**, cinco de cada diez en **Egipto** y **Marruecos** y seis de cada diez en el **Líbano**.
- En **Libia**, se ha detectado una prevalencia del VIH del 18% entre reclusos.
- Las relaciones sexuales sin protección (incluidas las remuneradas y entre varones) constituyen el otro factor determinante en las epidemias de la región. Se han encontrado niveles de infección por el VIH del 9-10%, 2,2% y 4,4% entre profesionales femeninas del sexo en Saida y Tamanrasset, en **Argelia, Marruecos** y el **Sudán**, respectivamente.

Contactos

Yasmine Topor | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 3501 | topory@unaids.org
Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org