



Source: Le point sur l'épidémie de SIDA – Décembre 2006

## Moyen-Orient et Afrique du Nord

### Généralités

- On estime que 68 000 personnes ont contracté le VIH en 2006, ce qui porte à 460 000 le total des personnes vivant avec le virus dans la région. Quelque 36 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2006.
- La plupart des infections notifiées se sont produites chez des hommes, mais la proportion de femmes infectées est en hausse.
- Des systèmes de surveillance du VIH inégaux (et, en bien des endroits, insuffisants), rendent difficile une évaluation précise des caractéristiques et tendances des épidémies dans de nombreux pays de cette région—particulièrement au sein des groupes les plus exposés au risque tels que les consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.
- Une amélioration de la collecte des données dans certains pays (comme l'**Algérie**, la **République islamique d'Iran**, la **Jamahiriya arabe libyenne** et le **Maroc**) montre que des épidémies localisées de VIH se déroulent dans toute la région tandis qu'une épidémie généralisée persiste au **Soudan**.
- On estime que quelque 75 000 personnes de cette région auraient besoin d'une thérapie antirétrovirale, mais 4000 seulement en bénéficiaient à fin 2005.

### Evolution dans les pays

- C'est le **Soudan** qui connaît, de loin, la plus importante épidémie de SIDA dans cette région. Le taux de prévalence du VIH chez l'adulte était de 1,6% en 2005 et quelque 350 000 personnes vivaient avec le VIH. Les connaissances concernant le VIH au **Soudan** sont extrêmement limitées : seuls 2% d'un groupe d'hommes participant à une enquête savaient que les préservatifs peuvent prévenir la transmission du VIH. Une étude a relevé un taux de prévalence du VIH de 9,3% parmi des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes dans l'Etat de Khartoum.
- Des niveaux élevés d'infection à VIH ont été observés parmi les quelque 137 000 personnes qui s'injectent des drogues en **République islamique d'Iran**. Près d'un consommateur de drogues injectables sur quatre (23%) participant récemment à une étude dans la capitale iranienne, Téhéran, s'est révélé infecté par le VIH.
- Diverses études montrent qu'en **Algérie**, quatre consommateurs de drogues injectables sur 10 au moins partagent leur matériel d'injection, et qu'ils sont cinq sur 10 en **Egypte** et au **Maroc**, et six sur 10 au **Liban**.

- En **Jamahiriya arabe libyenne**, un taux de prévalence du VIH de 18% a été relevé parmi des détenus.
- Les rapports sexuels non protégés (y compris lors de rapports tarifés et de rapports entre hommes) sont également un facteur important dans les épidémies de la région. Des niveaux d'infection à VIH de 9%-10%, 2,2% et 4,4% ont été observés parmi les professionnelles du sexe à Saida et Tamanrasset en **Algérie**, au **Maroc** et au **Soudan**, respectivement.

## Contact

Yasmine Topor | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 3501 | [topory@unaids.org](mailto:topory@unaids.org)

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)