



**ONUSIDA**  
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR  
UNICEF  
FMA  
PNUD  
UNFPA  
ONUDD  
OIT  
UNESCO  
OMS  
BANCO MUNDIAL



**Organización  
Mundial de la Salud**

## Hoja informativa

06

Situación de la epidemia de SIDA, diciembre de 2006

### **América del Norte y Europa occidental y central**

#### **Panorama**

- En estas regiones, el número total de personas que viven con el VIH continúa aumentando –debido en gran parte a los efectos de la terapia antirretrovírica sobre la supervivencia–, con un número relativamente estable de nuevas infecciones anuales en América del Norte y un incremento en el número de nuevos diagnósticos de VIH en Europa occidental desde 2002.
- En conjunto, aproximadamente 2,1 millones de personas estaban viviendo con el VIH en 2006, incluidas las 65 000 que contrajeron el VIH durante ese año.
- En el contexto de un acceso generalizado a tratamiento antirretrovírico eficaz, en 2006 falleció por SIDA un número estimado comparativamente bajo de personas (30 000) en estas regiones.

#### **Situación en los países**

- Se estima que, en todo el mundo, sólo siete países tienen más personas infectadas por el VIH que los **Estados Unidos de América**: 1,2 millones vivían con el virus en 2005.
- En 2001-2004, el 50% de los diagnósticos de SIDA correspondió a afroamericanos y el 20% a hispanos (que sólo constituyen, respectivamente, el 12% y el 14% de la población de los **Estados Unidos**).
- Los varones todavía representan la mayoría de los diagnósticos de VIH en los **Estados Unidos** (alrededor del 73% en 2004). Casi las dos terceras partes de las infecciones por el VIH diagnosticadas en varones en 2004 podían atribuirse a relaciones sexuales peligrosas con otros varones, y varios estudios han aportado pruebas de un incremento de los comportamientos sexuales de riesgo en ese grupo de población.
- El suministro de terapia antirretrovírica se ha traducido en un descenso de las tasas de mortalidad por SIDA del 80% entre 1990 y 2003. En los **Estados Unidos** se han salvado al menos tres millones de años de vida como resultado directo de la atención y tratamiento eficaces de pacientes con SIDA.
- Se estima que, a finales de 2005, había unas 58 000 personas que vivían con el VIH en el **Canadá**, lo que representa un incremento del 16% respecto a la estimación de 50 000 en 2002.
- Unas 740 000 personas estaban viviendo con el VIH en **Europa occidental y central** en 2006.
- En **Europa occidental**, algo más de un tercio (35%) de las infecciones por el VIH se produjeron en el curso de relaciones sexuales entre varones, mientras que más de la mitad (56%) se contrajeron durante el coito heterosexual.

- Aproximadamente las tres cuartas partes de las infecciones contraídas por vía heterosexual en **Europa occidental** se dieron entre inmigrantes y migrantes, lo que refuerza la necesidad de adaptar los servicios de prevención, tratamiento y atención de forma que lleguen a esas poblaciones.
- El mayor incremento en el número anual de nuevos casos de VIH ha correspondido al **Reino Unido**, donde los diagnósticos se han duplicado desde 2000, superando los 7200 en 2004 y llegando a 7700 en 2005.
- Alrededor de un tercio de las personas que viven con el VIH en el **Reino Unido** no saben que están infectados, y el conocimiento del VIH se está deteriorando. En una encuesta de 2005, sólo el 70% de los que respondieron en Londres sabía que el virus puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección.
- Los estudios en poblaciones específicas de varones que tienen relaciones sexuales con varones revelan una prevalencia del VIH del 10-20% en **Europa occidental**, y varios estudios han comunicado un incremento en la proporción de tales varones que han tenido recientemente prácticas sexuales de alto riesgo.
- En comparación con 2001, el número de diagnósticos de VIH en varones que tienen relaciones sexuales con varones fue tres cuartas partes mayor (75%) en los **Países Bajos**, más de dos tercios mayor en **Portugal** (68%) y **Suiza** (71%) y un 40% mayor en **Bélgica** en 2005.
- En varios países resulta evidente la eficacia de los programas de reducción del daño para controlar las infecciones por el VIH entre consumidores de drogas intravenosas. En **Portugal**, los diagnósticos de VIH en este grupo fueron casi un tercio menores en 2005 que en 2001; en **España**, la prevalencia del VIH entre consumidores de drogas intravenosas se redujo a la mitad en Barcelona (de 44% pasó a 21% entre 1995 y 2001-2003); y en los **Países Bajos** el número de nuevos diagnósticos de VIH descendió de 174 en 2002 a 29 en 2005.
- Las epidemias en **Europa central** siguen siendo pequeñas en comparación con las del resto de Europa. Sólo cuatro países comunicaron más de 100 nuevos diagnósticos de VIH en 2005.

## Contactos

Yasmine Topor | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 3501 | [topory@unaids.org](mailto:topory@unaids.org)

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)