



**ONUSIDA**  
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR  
UNICEF  
FMA  
PNUD  
UNFPA  
ONUDD  
OIT  
UNESCO  
OMS  
BANCO MUNDIAL



**Organización  
Mundial de la Salud**

# Hoja informativa

06

Situación de la epidemia de SIDA, diciembre de 2006

## Oceanía

### Panorama

- Se estima que 7100 personas han contraído el VIH en 2006, lo que eleva a 81 000 el número total de personas que viven con el virus en la región. En 2006, cerca de 4000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA en Oceanía.

### Situación en los países

- Las tres cuartas partes de las personas que viven con el VIH en Oceanía corresponden a **Papua Nueva Guinea**. En ese país, la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 1,8% en 2005 y estaban viviendo con el virus unas 57 000 personas mayores de 15 años.
- Los estudios señalan que la prevalencia en zonas urbanas de **Papua Nueva Guinea** podría llegar hasta el 3,5%. Las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables: los niveles de infección por el VIH entre las de 15-29 años son dos veces mayores que entre los varones de la misma edad.
- Aunque los datos disponibles son motivo de preocupación, también sugieren que **Papua Nueva Guinea** todavía está a tiempo de contener su creciente epidemia si amplía con rapidez y mantiene programas eficaces y bien enfocados de prevención del VIH.
- La epidemia de VIH de **Australia** todavía gira principalmente en torno a las prácticas sexuales peligrosas entre varones, que han representado más de los dos tercios de las nuevas infecciones por el VIH diagnosticadas a lo largo de esta década. Los nuevos diagnósticos de VIH están aumentando: 899 en 2004 y 954 en 2005. La epidemia de Australia sigue un patrón distinto en la población indígena del país. Las mujeres indígenas corren un riesgo especial de infección por el VIH: su probabilidad de infectarse es 18 veces mayor que la de las mujeres no indígenas y tres veces mayor que la de los varones no indígenas.
- Los nuevos diagnósticos de VIH en **Nueva Zelanda** llegaron a 218 en 2005, la cifra más alta desde que se implantaron las pruebas del VIH en 1985. Las prácticas sexuales peligrosas entre varones representaron poco más de la mitad (51%) de los nuevos diagnósticos de VIH en 2005, mientras que el coito heterosexual fue responsable de más de un tercio (37%).
- Ninguno de los otros países y territorios de Oceanía ha comunicado más de 300 casos de VIH desde que comenzaron las pruebas. Sin embargo, en muchos de esos países y territorios son prevalentes ciertos factores de riesgo asociados a brotes de VIH.
- En **Fiji, Kiribati y Vanuatu** sólo una cuarta parte de las personas que presuntamente corrían riesgo de infección por el VIH sabía cómo prevenir la infección.
- En **Samoa, Islas Salomón y Vanuatu**, el 9% de los varones jóvenes encuestados dijeron que habían pagado para tener relaciones sexuales durante los 12 meses anteriores, y a pesar de ello, sólo uno de cada diez señaló que había utilizado preservativos habitualmente durante las relaciones sexuales comerciales.

### Contactos

Yasmine Topor | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 3501 | [topory@unaids.org](mailto:topory@unaids.org)

Uniendo al mundo contra el SIDA

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)