

Океания

Общий обзор

- По оценкам, 7100 человек заразились ВИЧ в Океании в 2006 году, таким образом, общее число людей, живущих с вирусом в регионе, составило 81 000 человек. В 2006 году в Океании около 4000 человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом.

Положение в странах

- Три четверти людей, живущих с ВИЧ в Океании, живут в **Папуа-Новой Гвинее**. В 2005 году распространенность ВИЧ среди взрослого населения составляла здесь 1,8%, и около 57 000 человек в возрасте старше 15 лет жили с ВИЧ.
- Исследования показывают, что распространенность в городах **Папуа-Новой Гвинеи** может достигать 3,5%; при этом особенно уязвимы молодые женщины. Уровень ВИЧ-инфекции среди женщин в возрасте 15-29 лет в два раза выше, чем среди мужчин того же возраста.
- Хотя имеющиеся данные о ВИЧ вызывают беспокойство, они также позволяют предположить, что **Папуа-Новая Гвинея** все еще в состоянии сдержать растущую эпидемию при условии быстрого расширения и обеспечения устойчивости эффективных и целенаправленных программ профилактики ВИЧ-инфекции.
- Основной движущей силой эпидемии ВИЧ в **Австралии** до сих пор остается небезопасный секс между мужчинами, на который в этом десятилетии пришлось более двух третей новых диагнозов ВИЧ. Число новых диагнозов снова начало расти и составило 899 случаев в 2004 году и 954 в 2005 году. Эпидемия среди коренного населения **Австралии** развивается по другой модели. Женщины-представительницы коренного населения подвергаются особенно высокому риску ВИЧ-инфекции: по данным исследований, вероятность ВИЧ-инфекции среди них в 18 раз выше, чем среди женщин, не принадлежащих к коренному населению, и в три раза выше, чем среди мужчин, не являющихся представителями коренного населения.
- В **Новой Зеландии** в 2005 году число новых диагнозов ВИЧ достигло 218 – это самое высокое число с начала проведения тестирования в 1985 году. Небезопасный секс между мужчинами стал причиной чуть более половины (51%), а гетеросексуальные отношения – более одной трети (37%) новых диагнозов ВИЧ.
- Ни в одной другой стране и территории данного региона не было зарегистрировано более 300 случаев ВИЧ с начала проведения тестирования. Однако факторы риска, приводящие к вспышкам ВИЧ-инфекции, присутствуют во многих этих странах и территориях.
- Только одна четвертая часть людей, предположительно, подвергающихся риску в **Фиджи, Кирибати и Вануату**, знают, как предотвратить заражение ВИЧ.

- В **Самоа**, на **Соломоновых Островах** и в **Вануату** 9% молодых мужчин указали, что пользовались услугами платного секса в последние 12 месяцев, при этом только один из десяти из них сообщил, что постоянно пользуется презервативами во время коммерческого секса, а каждый пятый молодой мужчина сообщил, что занимался сексом с другими мужчинами.

Контактные лица:

Ясмин Топор | ЮНЭЙДС Женева | тел. +41 22 791 3501 | topory@unaids.org

Софи Бартон-Нотт | ЮНЭЙДС Женева | тел.+41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org