



ONUSIDA
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR
UNICEF
FMA
PNUD
UNFPA
ONUDD
OIT
UNESCO
OMS
BANCO MUNDIAL



**Organización
Mundial de la Salud**

Hoja informativa

06

Situación de la epidemia de SIDA, diciembre de 2006

Asia

Panorama

- Se estima que 8,6 millones de personas estaban viviendo con el VIH en Asia en 2006, incluidos alrededor de 960 000 nuevos casos diagnosticados. Aproximadamente 630 000 personas han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA en 2006.
- El número de personas que reciben terapia antirretrovírica ha aumentado en más de tres veces desde 2003, hasta llegar a una cifra estimada de 235 000 en junio de 2006. Esto representa alrededor del 16% del número total de personas que necesitan tratamiento antirretrovírico en Asia.
- Sólo **Tailandia** ha logrado proporcionar tratamiento como mínimo al 50% de las personas que lo necesitan.

Situación en los países

- En **China** se estima que, a finales de 2005, vivían con el VIH 650 000 [390 000-1,1 millones] personas. Se cree que casi la mitad (44%) de las personas que viven con el VIH en el país se han infectado a través de la inyección de drogas. La adopción de riesgos sexuales entre los consumidores de drogas intravenosas acrecienta la probabilidad de propagación del VIH dentro y más allá de este grupo de población.
- En conjunto, se estima que en 2005 la mitad de las nuevas infecciones por el VIH en China se produjo en el curso de relaciones sexuales sin protección. Esto indica que el VIH se está propagando gradualmente de las personas expuestas a un mayor riesgo a la población general, y subsiguientemente el número de mujeres que se infectan por el VIH está creciendo.
- La epidemia de VIH de la **India** parece haberse estabilizado o disminuir en algunas partes del país mientras en otras crece a una tasa moderada. En 2005 estaban viviendo con el VIH aproximadamente 5,7 millones de personas. El grueso de las infecciones por el VIH en la India se produce en el curso del coito heterosexual sin protección. En consecuencia, las mujeres representan una proporción creciente de las personas que viven con el VIH (alrededor del 38% en 2005), especialmente en las zonas rurales.
- La epidemia de **Viet Nam** sigue creciendo, y ya se ha detectado el VIH en la totalidad de las 64 provincias y en todas las ciudades. El número de personas que viven con el VIH se ha duplicado desde 2000, hasta alcanzar una cifra estimada de 260 000 en 2005. El VIH infecta cada año a unas 40 000 personas; la inmensa mayoría de ellas son consumidores de drogas intravenosas o personas que comercian con el sexo.
- Parece que la epidemia de **Camboya** se está estabilizando, después de haber disminuido desde finales de los años 1990. Hay pruebas muy sólidas de que las iniciativas para el cambio de comportamiento introducidas por el Estado y las organizaciones no gubernamentales han resultado eficaces, sobre todo en la industria del sexo.
- En **Tailandia**, se estima que 580 000 adultos y niños vivían con el VIH a final de 2005. El número de nuevas infecciones anuales por el VIH sigue descendiendo: las 18 000

nuevas infecciones estimadas en 2005 representan un 10% menos que en 2004. Sin embargo, un gran porcentaje de las nuevas infecciones por el VIH ocurre en personas a las que se consideraría de bajo riesgo. Aproximadamente un tercio de las nuevas infecciones en 2005 correspondió a mujeres casadas que probablemente fueron infectadas por sus esposos.

- En **Tailandia**, Los varones que tienen relaciones sexuales con varones continúan corriendo un alto riesgo de infección por el VIH. En Bangkok, la prevalencia del VIH ha aumentado drásticamente en este grupo de población: del 17% en 2003 al 28% en 2005. Entre los de edad igual o inferior a 22 años, la prevalencia aumentó del 13% al 22% durante el mismo periodo.
- El consumo de drogas intravenosas sigue siendo un factor de riesgo de infección en la epidemia de **Tailandia**. Se estima que están infectados por el VIH un 45% de los consumidores de drogas intravenosas que acuden a centros de tratamiento y que cada año el 3-10% de ellos contrae la infección. Esto es debido principalmente a la gran proporción de consumidores de drogas intravenosas que utilizan equipos de inyección contaminados (alrededor del 35%, según un estudio reciente).
- En **Myanmar** hay indicios preliminares de que la epidemia podría estar disminuyendo. Los niveles de infección por el VIH han descendido entre las mujeres embarazadas (1,3% en 2005 frente a 2,2% en 2000) y entre los varones que solicitan tratamiento por otras infecciones de transmisión sexual (del 8% en 2001 al 4% en 2005). De todas formas, el país está experimentando una grave epidemia, con una cifra estimada de 360 000 personas que vivían con el VIH a final de 2005 y una prevalencia nacional del VIH en adultos que se aproxima al 1,3%. Un dato que preocupa seriamente es que la prevalencia del VIH en jóvenes (15-24 años) llegó al 2,2% en 2005. Asimismo, en 2005 vivían con el VIH un 43% de los consumidores de drogas intravenosas y cerca de un tercio (32%) de los profesionales del sexo en todo el país.
- En el **Pakistán**, los altos niveles de infección por el VIH entre grupos de consumidores de drogas intravenosas podrían trasladarse a otras poblaciones, incluidos los profesionales del sexo tanto masculinos como femeninos.
- Hay constancia de que el VIH ya está presente en **Afganistán**, donde las condiciones favorecen una rápida propagación del virus. La emergente epidemia de ese país entronca probablemente con una combinación de consumo de drogas intravenosas y relaciones sexuales remuneradas peligrosas.
- Los altos niveles de infección por el VIH registrados entre los 145 000-170 000 consumidores de drogas intravenosas que se estima que hay en **Indonesia** presagian posibles brotes de VIH más amplios en el país. Unos 170 000 adultos estaban viviendo con el VIH en 2005.
- En **Papua**, el VIH está bien arraigado actualmente en la población general. Se ha comprobado que casi el 1% de los adultos en varias aldeas están viviendo con el VIH. El principal factor que contribuye a esta epidemia localizada parece radicar en las relaciones sexuales remuneradas sin protección, en una cultura en la que hasta el 10-15% de los varones jóvenes (15-24 años) compra sexo.
- Se estima que, en 2005, unas 69 000 personas estaban viviendo con el VIH en **Malasia**, donde el factor de riesgo más común de infección por el VIH era la exposición a equipos no estériles de inyección de drogas (que fue responsable de tres de cada cuatro infecciones en 2002, la mayoría de ellas en varones de 20-40 años).
- En **Filipinas**, donde el VIH se está transmitiendo principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, la prevalencia nacional del VIH en adultos se mantiene muy por

debajo del 0,1%. Aproximadamente un tercio de las infecciones diagnosticadas desde 1984 ha incidido en trabajadores filipinos que regresan de ultramar (sobre todo marineros y personal doméstico). Los esfuerzos para detectar y tratar sistemáticamente infecciones de transmisión sexual entre los profesionales del sexo, junto con otras iniciativas de prevención instauradas desde comienzos de los años 1990, han contribuido posiblemente a frenar la propagación del virus en las relaciones sexuales remuneradas. Menos del 1% de los profesionales del sexo están infectados por el VIH.

- Aproximadamente 17 000 adultos y niños vivían con el VIH en el **Japón** en 2005. En ese país se está registrando un número creciente de infecciones en varones que tienen relaciones sexuales con varones, que representan como mínimo el 60% de los casos anuales de VIH notificados.

Contactos

Yasmine Topor | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 3501 | topory@unaids.org

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org