



Hoja informativa

06

Diciembre de 2006

- Un total de 39,5 millones de personas vivían con el VIH en 2006, 2,6 millones más que en 2004.
- El número de nuevas infecciones por el VIH ascendió a 4,3 millones en 2006, 400 000 más que en 2004.
- África subsahariana sigue siendo la región más castigada por la epidemia mundial. Las dos terceras partes del total mundial de personas que viven con el VIH corresponden a África subsahariana, donde 24,7 millones vivían con el VIH en 2006. Asimismo, casi las tres cuartas partes del total de fallecimientos de adultos y niños causados por el SIDA en 2006 tuvieron lugar en África subsahariana: 2,1 millones del total mundial de 2,9 millones.
- En los últimos dos años, el número de personas que vive con el VIH aumentó en todas las regiones del mundo. El incremento más preocupante se registró en Asia oriental y en Europa oriental y Asia central, donde el número de personas que vivían con el VIH en 2006 fue una quinta parte (21%) más alto que en 2004.
- A nivel mundial y en cada una de las regiones, actualmente hay más mujeres adultas (de 15 años o más) que nunca que viven con el VIH. Los 17,7 millones de mujeres que vivían con el VIH en 2006 representaron un aumento de más de un millón en comparación con 2004.
- El acceso al tratamiento y la atención ha aumentado significativamente en los últimos años, aunque a partir de un nivel muy bajo en muchos países. Se estima que a través del suministro de tratamiento antirretrovírico se han ganado dos millones de años de vida desde 2002 en los países de ingresos bajos y medianos.
- La importancia de los comportamientos de riesgo (como el consumo de drogas intravenosas, las relaciones sexuales remuneradas sin protección y las relaciones sexuales sin protección entre varones) resulta especialmente evidente en las epidemias de VIH de Asia, Europa oriental y América Latina.
- Aunque las epidemias también se propagan a las poblaciones generales de todo el mundo, siguen estando muy concentradas en grupos de población específicos.

Estadísticas regionales

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones 2006	Defunciones por SIDA 2006	Prevalencia en adultos (%)
África subsahariana	24,7 millones	2,8 millones	2,1 millones	5,9%
Asia meridional y sudoriental	7,8 millones	860 000	590 000	0,6%
Asia oriental	750 000	100 000	43 000	0,1%
América Latina	1,7 millones	140 000	65 000	0,5%
América del Norte	1,4 millones	43 000	18 000	0,8%
Europa occidental y central	740 000	22 000	12 000	0,3%
Europa oriental y Asia central	1,7 millones	270 000	84 000	0,9%

Oriente Medio y África del Norte	460 000	68 000	36 000	0,2%
Caribe	250 000	27 000	19 000	1,2%
Oceanía	81 000	7100	4000	0,4%
Total	39,5 millones	4,3 millones	2,9 millones	1%

Prevención¹

- Todos los años el número de nuevas infecciones por el VIH supera el de fallecimientos por enfermedades relacionadas con el SIDA, y a medida que aumenta el número de personas que se infectan por el VIH crece la cifra de personas que fallecen por enfermedades relacionadas con el SIDA.
- En todo el mundo, menos de una de cada cinco personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH tiene acceso a servicios básicos de prevención. Actualmente, sólo una de cada ocho personas que desean someterse a la prueba del VIH puede hacerlo.
- La ampliación de estrategias de prevención disponibles en 125 países de ingresos bajos y medianos podría evitar unos 28 millones de nuevas infecciones entre 2005 y 2015, más de la mitad de las que se prevé que se produzcan durante este período, y podría ahorrar US\$ 24 mil millones en costos relacionados con el tratamiento.

Tratamiento

- De acuerdo con los datos más recientes de la iniciativa ONUSIDA/OMS "Tres millones para 2005", más de 1,6 millones de personas que vivían con el VIH estaban recibiendo terapia antirretrovírica en países de ingresos bajos y medianos en junio de 2006.
- Esto representa un aumento de más de cuatro veces desde diciembre de 2003. En conjunto, la cobertura de tratamiento antirretrovírico en los países de ingresos bajos y medianos aumentó de un 7% a final de 2003 a un 24% en junio de 2006.

Región geográfica	Núm. estimado de personas que recibían terapia antirretrovírica, junio de 2006	Núm. estimado de personas que necesitaban terapia antirretrovírica, 2005	Cobertura de la terapia antirretrovírica, junio de 2006
África subsahariana	1 040 000	4 600 000	23%
América Latina y el Caribe	345 000	460 000	75%
Asia oriental, meridional y sudoriental	235 000	1 440 000	16%
Europa y Asia central	24 000	190 000	13%
Oriente Medio y África del Norte	4000	75 000	5%
Total	1 650 000	6,8 millones	24%

Nota: Algunas cifras no cuadran debido al redondeo.

Necesidades de recursos

- En 2005, se estima que había un total de US\$ 8300 millones disponibles para la financiación relativa al SIDA ; esta cantidad está previsto que aumente a US\$ 8900 millones en 2006 y US\$ 10 000 millones en 2007. No obstante, está muy por debajo de lo necesario: US\$ 14 900 millones en 2006, US\$ 18 100 millones en 2007 y US\$ 22 100 millones en 2008.

¹ Los datos actualizados sobre la cobertura de la prevención estarán disponibles para final de diciembre de 2006.

- En lo que respecta al tratamiento y la atención, alrededor del 55% de estos recursos se necesitarán en África, el 20% en Asia y el Pacífico, el 17% en América Latina y el Caribe, el 7% en Europa oriental y el 1% en América del Norte y Oriente Medio.

Necesidades de recursos para el SIDA (en US\$ miles de millones)

	2006	2007	2008	Totales para 2006–2008
Prevención	8,4	10,0	11,4	29,8
Tratamiento y atención	3,0	4,0	5,3	12,3
Huérfanos y niños vulnerables	1,6	2,1	2,7	6,4
Costos de programas	1,5	1,4	1,8	4,6
Recursos humanos	0,4	0,6	0,9	1,9
Total	14,9	18,1	22,1	55,1

Contacto

Oficina de Prensa del ONUSIDA | +41 22 791 1697 | communications@unaid.org |
www.unaids.org