

Aide-mémoire

06

Dernière mise à jour: Décembre 2006

- Un total de 39,5 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2006 (2,6 millions de plus qu'en 2004).
- Le nombre d'infections nouvellement contractées en 2006 a atteint 4,3 millions (400 000 de plus qu'en 2004).
- L'Afrique subsaharienne reste la région la plus atteinte au monde. Deux tiers de toutes les personnes vivant avec le VIH se trouvent en Afrique subsaharienne, où 24,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2006. C'est aussi en Afrique subsaharienne que sont survenus près des trois quarts de tous les décès d'adultes et d'enfants dus au SIDA : 2,1 millions sur le total mondial de 2,9 millions de décès dus au SIDA.
- Le nombre de personnes vivant avec le VIH a augmenté dans toutes les régions du monde au cours des deux années écoulées. La croissance la plus frappante s'observe en Asie de l'Est et dans la région de l'Europe orientale et Asie centrale, où le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2006 est supérieur d'un cinquième (21%) à celui de 2004.
- A l'échelle mondiale et dans chaque région, le nombre de femmes adultes (15 ans et plus) vivant avec le VIH est plus élevé que jamais. Les 17,7 millions de femmes vivant avec le VIH en 2006 constituent une augmentation de plus d'un million par rapport à 2004.
- L'accès aux traitements et à la prise en charge s'est considérablement accru ces dernières années, bien que de nombreux pays soient partis d'un niveau très bas. On estime que deux millions d'années de vie ont été épargnées depuis 2002 dans les pays à faible et moyen revenus grâce à l'extension de la fourniture de traitements antirétroviraux.
- La nature centrale des comportements à risque (tels que la consommation de drogues injectables, les rapports sexuels rémunérés non protégés et les rapports sexuels non protégés entre hommes) est particulièrement évidente dans les épidémies de VIH d'Asie, d'Europe orientale et d'Amérique latine.
- Bien que les épidémies s'étendent aux populations générales de par le monde, elles restent surtout concentrées dans des groupes particuliers de la population.

Statistiques régionales

	Personnes vivant avec le VIH	Nouvelles infections en 2006	Décès dus au SIDA en 2006	Prévalence chez l'adulte (%)
Afrique subsaharienne	24,7 millions	2,8 millions	2,1 millions	5,9%
Asie du Sud et du Sud-Est	7,8 millions	860 000	590 000	0,6%
Asie de l'Est	750 000	100 000	43 000	0,1%
Amérique latine	1,7 million	140 000	65 000	0,5%
Amérique du Nord	1,4 million	43 000	18 000	0,8%
Europe occidentale et centrale	740 000	22 000	12 000	0,3%

Europe orientale et Asie centrale	1,7 million	270 000	84 000	0,9%
Moyen-Orient et Afrique du Nord	460 000	68 000	36 000	0,2%
Caraïbes	250 000	27 000	19 000	1,2%
Océanie	81 000	7 100	4 000	0,4%
Total	39,5 millions	4,3 millions	2,9 millions	1%

Note : Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Prévention¹

- Le nombre annuel d'infections à VIH dépasse celui des décès dus au SIDA chaque année ; plus le nombre d'infections à VIH augmente, plus le nombre de décès dus à des maladies liées au SIDA augmentera.
- Pour l'ensemble de la population mondiale, moins d'une personne sur cinq exposées au risque d'une infection à VIH a accès à des services de prévention élémentaires. A travers le monde, seule une sur huit des personnes qui souhaiteraient être testées pour le VIH peut le faire à l'heure actuelle.
- On estime que le fait d'accroître le niveau des interventions stratégiques de prévention disponibles dans 125 pays à faible et moyen revenus permettrait d'éviter 28 millions de nouvelles infections entre 2005 et 2015, soit plus de la moitié des infections dont on prévoit qu'elles surviendraient au cours de cette période ; de même, on épargnerait ainsi 24 milliards de dollars des Etats-Unis, correspondant aux coûts de traitement associés à ces infections.

Traitement

- D'après les dernières données OMS/ONUSIDA de l'initiative '3 millions d'ici 2005', plus de 1,6 million de personnes vivant avec le VIH recevaient un traitement antirétroviral dans les pays à faible et moyen revenus en juin 2006.
- Cela représente plus qu'un quadruplement depuis décembre 2003. Dans l'ensemble, la couverture du traitement antirétroviral dans les pays à faible et moyen revenus est passée de 7% à fin 2003 à 24% en juin 2006.

Région géographique	Estimation du nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral, juin 2006	Estimation du nombre de personnes requérant un traitement antirétroviral, 2005	Couverture du traitement antirétroviral, juin 2006
Afrique subsaharienne	1 040 000	4 600 000	23%
Amérique latine et Caraïbes	345 000	460 000	75%
Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est	235 000	1,440 000	16%

¹ Des données mises à jour en ce qui concerne la couverture de la prévention seront disponibles d'ici à la fin décembre 2006.

Europe et Asie centrale	24 000	190 000	13%
Moyen-Orient et Afrique du Nord	4 000	75 000	5%
Total	1 650 000	6,8 millions	24%

Note : Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Ressources nécessaires

- En 2005, on estimait à 8,3 milliards de dollars en tout les sommes disponibles pour la lutte contre le SIDA ; on estime que ce chiffre est passé à 8,9 milliards en 2006 et à 10 milliards pour 2007. Il reste néanmoins insuffisant – il faudrait 14,9 milliards de dollars en 2006, 18,1 milliards en 2007 et 22,1 milliards en 2008.
- En ce qui concerne le traitement et la prise en charge, environ 55% de ces ressources seront requises pour l'Afrique, 20% en Asie et dans le Pacifique, 17% en Amérique latine et dans les Caraïbes, 7% en Europe orientale et 1% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Ressources nécessaires contre le SIDA (en milliards de dollars)

	2006	2007	2008	Total pour 2006–2008
Prévention	8,4	10,0	11,4	29,8
Traitement et prise en charge	3,0	4,0	5,3	12,3
Orphelins et enfants vulnérables	1,6	2,1	2,7	6,4
Coûts de programme	1,5	1,4	1,8	4,6
Ressources humaines	0,4	0,6	0,9	1,9
Total	14,9	18,1	22,1	55,1

Note: Certains chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Contact

Bureau de presse de l'ONUSIDA | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | www.unaids.org