



Глобальные факты и цифры

06

Источник: Развитие эпидемии СПИДа - декабрь 2006 г.

Общий обзор

- В 2006 году общее число людей, живущих с ВИЧ, составило 39,5 миллиона человек (что на 2,6 миллиона человек больше чем в 2004 году).
- Число новых инфекций в 2006 году увеличилось до 4,3 миллиона (что на 400 000 инфекций больше чем в 2004 году).
- Африка к югу от Сахары остается наиболее пострадавшим регионом в мире. Две трети всех людей, инфицированных ВИЧ, живут в Африке к югу от Сахары: в 2006 году здесь проживали 24,7 миллиона ВИЧ-инфицированных. В Африке к югу от Сахары зарегистрированы почти три четверти всех смертей от СПИДа среди взрослых и детей – 2,1 миллиона из 2,9 миллиона всех смертей от СПИДа, зарегистрированных во всем мире.
- За последние два года число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось во всех регионах мира. Наиболее сильный рост отмечен в Восточной Азии, а также в Восточной Европе и Центральной Азии, где в 2006 году число людей, живущих с ВИЧ, более чем на одну пятую (21%) превысило показатель за 2004 год.
- В настоящее время в глобальном масштабе и в каждом регионе число взрослых женщин (в возрасте 15 лет и старше), живущих с ВИЧ, как никогда большое. В 2006 году число женщин, живущих с ВИЧ, составляло 17,7 миллиона, что превышает аналогичный показатель за 2004 год более чем на один миллион.
- В последние годы доступ к лечению и уходу сильно увеличился, хотя во многих странах отправной уровень оказался очень низким. По оценкам, благодаря расширению антиретровирусного лечения в странах с низким и средним уровнем доходом с 2002 года удалось спасти два миллиона жизней.
- Центральная роль, которую играет поведение высокого риска (такое как употребление инъекционных наркотиков, незащищенные платные половые контакты и незащищенный секс между мужчинами), особенно заметно в развитии эпидемий ВИЧ в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке.
- Несмотря на то что во всем мире эпидемии также охватывают все слои населения, они по-прежнему сконцентрированы преимущественно в определенных группах населения.

Региональная статистика

	Число, людей, живущих с ВИЧ	Число новых инфекций, 2006 г.	Число смертей от СПИДа, 2006 г.	Показатель распространенности среди взрослых, %
Африка к югу от Сахары	24,7 млн.	2,8 млн.	2,1 млн.	5,9%
Южная и Юго-восточная Азия	7,8 млн.	860 000	590 000	0,6%
Восточная Азия	750 000	100 000	43 000	0,1%
Латинская Америка	1,7 млн.	140 000	65 000	0,5%

Северная Америка	1,4 млн.	43 000	18 000	0,8%
Западная и Центральная Европа	740 000	22 000	12 000	0,3%
Восточная Европа и Центральная Азия	1,7 млн.	270 000	84 000	0,9%
Ближний Восток и Северная Африка	460 000	68 000	36 000	0,2%
Карибский регион	250 000	27 000	19 000	1,2%
Океания	81 000	7 100	4 000	0,4%
Всего	39,5 млн.	4,3 млн.	2,9 млн.	1%

Профилактика¹

- Ежегодно число новых ВИЧ-инфекций превышает число смертей в связи со СПИДом, а по мере увеличения числа людей, инфицированных ВИЧ, увеличивается число людей, умерших от заболеваний, обусловленных СПИДом.
- В мировом масштабе менее одной пятой людей, которым грозит риск заражения ВИЧ, имеют доступ к основным услугам по профилактике. В настоящее время во всем мире лишь восьмая часть всех тех, кто хочет пройти тест (анализ на ВИЧ), могут это сделать.
- Чтобы опередить эпидемию, необходимо расширить и усилить действия по профилактике ВИЧ в рамках комплексных ответных мер, включая расширение доступа к лечению и уходу.
- Расширение стратегий профилактики, действующих в 125 странах с низким и средним уровнем доходов, позволит предупредить около 28 миллионов новых инфекций с 2005 по 2015 годы – более половины всех инфекций, которые, по прогнозам, могут иметь место за этот период, – а также сэкономят 24 миллиарда долларов США на лечении в связи с такими инфекциями.
- Параллельное расширение профилактики и лечения позволит предотвратить 29 миллионов новых инфекций к концу 2020 года.

Лечение

- Согласно последним данным инициативы «3 к 5» ЮНЭЙДС/ВОЗ, в июне 2006 года более 1,6 миллиона человек, живущих с ВИЧ, получали АРВ-терапию в странах с низким и средним уровнем доходов.
- Это составляет более чем четырехкратный рост с декабря 2003 года. В целом, охват антиретровирусным лечением в странах с низким и средним уровнем доходов увеличился с 7% по состоянию на конец 2003 года до 24% в июне 2006 года.

¹ Обновленные данные по охвату профилактикой будут выпущены к концу декабря 2006 г.

Географический регион	Оценочное число людей, получающих АРВ-терапию, июнь 2006 г.	Оценочное число людей, нуждающихся в АРВ-терапии, 2005 г.	Охват АРВ-терапией, июнь 2006 г.
Африка к югу от Сахары	1 040 000	4 600 000	23%
Латинская Америка и Карибский регион	345 000	460 000	75%
Восточная, Южная и Юго-восточная Азия	235 000	1 440 000	16%
Европа и Центральная Азия	24 000	190 000	13%
Ближний Восток и Северная Африка	4 000	75 000	5%
Всего	1 650 000	6,8 млн.	24%

Примечание: Некоторые цифры не дают точную сумму вследствие округления

Потребности в ресурсах

- В 2005 году, по оценкам, на финансирование мероприятий в связи со СПИДом было выделено 8,3 миллиарда долларов США; согласно оценкам, эта цифра увеличится до 8,9 миллиарда долларов США в 2006 году и до 10 миллиардов долларов США в 2007 году. Однако она не отвечает потребностям, которые составят 14,9 миллиарда долларов США в 2006 году, 18,1 миллиарда долларов США в 2007 году и 22,1 миллиарда долларов США в 2008 году.
- Что касается лечения и ухода, около 55% этих ресурсов потребуются для Африки, 20% для Азии и Тихоокеанского региона, 17% для Латинской Америки, 7% для Восточной Европы и 1% для Северной Африки и Ближнего Востока.

Потребности в ресурсах для борьбы со СПИДом (миллиардов долларов США)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Всего на 2006–2008 гг.*
Профилактика	8,4	10,0	11,4	29,8
Лечение и уход	3,0	4,0	5,3	12,3
Сироты и уязвимые дети	1,6	2,1	2,7	6,4
Программные расходы	1,5	1,4	1,8	4,6
Кадровые ресурсы	0,4	0,6	0,9	1,9
Всего	14,9	18,1	22,1	55,1

Контактный телефон

Пресс-офис ЮНЭЙДС | +41 22 791 1697 | communications@unaid.org | www.unaids.org