

Ближний Восток и Северная Африка

Общий обзор

- По оценкам, в 2006 году 68 000 человек заразились ВИЧ, а общее число людей, живущих с вирусом в данном регионе, достигло 460 000 человек. В 2006 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке от болезней, обусловленных СПИДом, умерло приблизительно 36 000 человек.
- Наибольшее количество ВИЧ-инфекций было зарегистрировано среди мужчин, однако растет число и ВИЧ-инфицированных женщин.
- Нестабильные (а во многих местах и неадекватные) системы эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией затрудняют проведение точной оценки моделей и тенденций развития эпидемий во многих странах этого региона – особенно, среди групп с самой высокой степенью риска, например, потребителей инъекционных наркотиков, работников секс-бизнеса и мужчин, практикующих секс с мужчинами.
- Благодаря усовершенствованным методам сбора данных в некоторых странах (таких как **Алжир, Иран, Ливия и Марокко**) было выявлено, что по всему региону существуют локализованные эпидемии, в то время как в **Судане** сохраняется генерализованная эпидемия.
- По оценкам, в данном регионе в антиретровирусной терапии нуждается около 75 000 человек, однако в конце 2005 года ее получали всего 4000 человек.

Положение в странах

- Самая значительная эпидемия в данном регионе отмечается в **Судане**. В 2005 году показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения составил 1,6%, и насчитывалось приблизительно 350 000 людей, живущих с ВИЧ. Знания о ВИЧ в **Судане** крайне скудны: только 2% из опрошенных мужчин знали о том, что использование презерватива может предотвратить передачу ВИЧ. В ходе одного исследования в штате Хартум среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами, была обнаружена распространенность ВИЧ на уровне 9,3%.
- Высокие показатели распространенности ВИЧ были выявлены среди потребителей инъекционных наркотиков в **Иране**, оценочное число которых составляет 137 000 человек. Приблизительно один из четырех (23%) потребителей инъекционных наркотиков, принимавших участие в недавнем исследовании, которое проводилось в столице Ирана Тегеране, оказался ВИЧ-инфицированным.
- В ходе исследований было выявлено, что четыре из десяти потребителей инъекционных наркотиков в **Алжире**, пять из десяти в **Египте** и **Марокко** и шесть из десяти в **Ливане** пользовались общими шприцами.
- В **Ливии** среди заключенных была выявлена распространенность ВИЧ на уровне 18%.

- Другим основным фактором риска в эпидемиях в этом регионе является незащищенный секс (в том числе коммерческий или секс между мужчинами). Уровни ВИЧ-инфекции, составляющие 9%–10%, 2,2% и 4,4% были выявлены среди женщин секс-бизнеса в городах Саида и Таманрассет в **Алжире**, в **Марокко** и **Судане** соответственно.

Контактные лица:

Ясмин Топор | ЮНЭЙДС Женева | тел. +41 22 791 3501 | topory@unaids.org

Софи Бартон-Нотт | ЮНЭЙДС Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org