



Source: Le point sur l'épidémie de SIDA – Décembre 2006

Océanie

Généralités

- On estime que 7100 personnes ont contracté le VIH en Océanie en 2006, ce qui porte à 81 000 le nombre de personnes vivant avec le virus dans la région. En 2006 quelque 4000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA en Océanie.

Evolution dans les pays

- Trois quarts des personnes vivant avec le VIH se trouvent en **Papouasie-Nouvelle-Guinée**. Le taux national de prévalence du VIH chez l'adulte se situait autour de 1,8% en 2005 et quelque 57 000 personnes de plus de 15 ans vivaient avec le VIH.
- Des études ont montré que la prévalence dans les zones urbaines de **Papouasie-Nouvelle-Guinée** pouvait atteindre 3,5%, les jeunes femmes étant particulièrement vulnérables. Les niveaux d'infection à VIH parmi les femmes de 15 à 29 ans sont deux fois supérieurs à ceux observés chez les hommes du même groupe d'âge.
- Si les données disponibles sont préoccupantes, elles suggèrent aussi que la **Papouasie-Nouvelle-Guinée** pourrait encore maîtriser la croissance de son épidémie si des programmes efficaces et bien ciblés de prévention du VIH sont rapidement élargis et se poursuivent à long terme.
- L'épidémie de VIH en **Australie** reste principalement liée aux rapports sexuels non protégés entre hommes, qui ont représenté plus de deux tiers des nouvelles infections à VIH diagnostiquées jusqu'ici au cours de cette décennie. Les nouveaux diagnostics ont augmenté pour atteindre 899 en 2004 et 954 en 2005. L'épidémie de **Australie** suit un autre schéma dans la population autochtone du pays. Les femmes autochtones sont particulièrement exposées au risque d'infection à VIH : des études ont montré que leur risque est 18 fois plus élevé que celui des femmes non autochtones et trois fois plus élevé que celui des hommes non autochtones.
- Les nouveaux diagnostics de VIH en **Nouvelle-Zélande** ont atteint un maximum de 218 en 2005, chiffre le plus élevé depuis l'introduction du dépistage en 1985. Les rapports sexuels non protégés entre hommes ont représenté la moitié (51%) des nouveaux diagnostics de VIH, alors que les rapports hétérosexuels comptaient pour plus d'un tiers (37%).

- Aucun des autres pays et territoires d'Océanie n'a annoncé plus de 300 cas de VIH depuis l'introduction du dépistage. Cependant, les facteurs de risque associés aux flambées de VIH sont très présents dans un grand nombre de ces pays et territoires.
- Un quart seulement des personnes considérées comme exposées au risque d'infection à VIH à **Fiji**, **Kiribati** et **Vanuatu** savent comment prévenir la transmission du VIH.
- A **Samoa**, aux **Iles Salomon** et à **Vanuatu**, 9% des jeunes hommes ont déclaré avoir payé pour des rapports sexuels au cours des 12 mois précédents, mais un sur 10 d'entre eux seulement disait avoir systématiquement recours au préservatif lors de rapports sexuels tarifés, et un jeune homme sur cinq déclarait avoir des rapports sexuels avec des hommes.

Contact

Yasmine Topor | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 3501 | topory@unaids.org

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org