

Источник: Развитие эпидемии СПИДа - декабрь 2006 г.

Африка к югу от Сахары

Общий обзор

- Почти две трети (63%) всех людей, инфицированных ВИЧ в мире, проживают в Африке к югу от Сахары – 24,7 миллиона человек по оценкам за 2006 год.
- Число взрослых и детей, заразившихся ВИЧ в 2006 году, составило 2,8 миллиона человек – это больше чем во всех других регионах мира вместе взятых.
- Число смертей от СПИДа в Африке к югу от Сахары – 2,1 миллиона – составляет 72% от общего числа смертей от СПИДа в мире.
- Тенденции развития эпидемий ВИЧ в Африке различны. Имеются данные о сокращении или стабилизации распространения ВИЧ в большинстве стран Восточной и Западной Африки, в то же время в некоторых странах есть признаки нарастания эпидемий. На юге Африки только в **Зимбабве** имеются данные, указывающие на сильное снижение национального показателя распространенности ВИЧ. В ряде других стран – включая **Южную Африку** – пока что нет признаков ослабления эпидемий.
- В странах этого района несоразмерно большая часть обусловленной СПИДом нагрузки ложится на женщин: они не только чаще мужчин заражаются ВИЧ, но в большинстве стран именно на женщин чаще всего ложится обязанность по уходу за людьми, живущими с ВИЧ.
- Масштабы антиретровирусного лечения в Африке к югу от Сахары резко расширились: к июню 2006 года антиретровирусное лечение получали более одного миллиона человек, что в десять раз больше по сравнению с декабрем 2003 года.
- В последнее время усилия по расширению масштабов лечения были особенно активными в ряде стран, включая **Ботсвану, Замбию, Кению, Малави, Намибию, Руанду, Уганду и Южную Африку**. Однако сами масштабы потребностей в этом регионе означают, что здесь антиретровирусное лечение получают чуть менее четверти (23%) от оценочного числа всех нуждающихся, составляющего 4,6 миллиона человек.

Положение в странах

- Юг Африки остается эпицентром глобальной эпидемии ВИЧ: 32% людей, инфицированных ВИЧ во всем мире, живут в этом субрегионе; здесь также зарегистрировано 34% всех случаев смерти от СПИДа в мире.
- Данные о снижении национального показателя распространенности ВИЧ среди взрослых на юге Африки поступают только из **Зимбабве**, где снизились показатели и распространенности, и заболеваемости ВИЧ. Это, вероятно, связано с рядом факторов, особенно с уменьшением числа «случайных» половых связей, а также с ростом практики использования презервативов и более поздним началом половой жизни. Такому изменению поведения, вероятно, способствовали повышение уровня информированности о СПИДе, относительное расширение инфраструктуры здравоохранения и нарастающее беспокойство в связи со смертностью от СПИДа. Кроме того, снижению показателя распространенности ВИЧ значительно способствовали высокие показатели смертности.

- В 2005 году в **Южной Африке** с ВИЧ жили около 5,5 миллиона человек, включая 240 000 детей моложе 15 лет.
- Вспышка туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, обнаруженная в начале сентября в КваЗулу-Натал, подчеркнула смертоносное сочетание ВИЧ и ТБ в **Южной Африке**, где, по оценкам, 60% больных туберкулезом также инфицированы ВИЧ.
- **Свазиленд** в настоящее время имеет самый высокий в мире показатель распространенности ВИЧ – 33,4%.
- Национальный показатель распространенности ВИЧ также является высоким в **Ботсване, Лесото и Намибии** (20–24%).
- Островные государства у южного побережья Африки имеют намного более слабые эпидемии. В 2005 году на **Мадагаскаре** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых был намного ниже 1%. В то же время знания о ВИЧ слабые, а практика пользования презервативами почти отсутствует.
- В **Восточной Африке** общие тенденции к стабилизации или снижению показателя распространенности ВИЧ, похоже, сохраняются.
- Эпидемия в **Уганде**, масштабы которой в 1990-х годах сократились, в целом, вероятно, стабилизировалась. В 2005 году национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 6,7%, однако он был значительно выше среди женщин (почти 8%), чем среди мужчин (5%). В то же время в некоторых сельских районах в настоящее время наблюдается рост числа ВИЧ-инфекций. Согласно данным исследования, проведенного в 25 деревнях, показатель распространенности ВИЧ увеличился с низкого уровня в 5,6% среди мужчин и 6,9% среди женщин в 2000 году до 6,5% среди мужчин и 8,8% среди женщин в 2004 году.
- В **Западной Африке** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых по-прежнему остается намного ниже по сравнению с другими частями Африки к югу от Сахары. Национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых превышает 4% только в **Кот-д’Ивуаре** и составляет 2% или ниже в ряде других стран, особенно в странах сахеля.
- В большей части **Восточной Африки** тенденции распространения ВИЧ в целом являются устойчивыми, хотя в ряде городов, включая Уагадугу (**Буркина-Фасо**), Абиджан (**Кот-д’Ивуар**) и Ломе (**Того**), отмечено снижение этого показателя среди беременных женщин.
- В **Сенегале** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составляет чуть ниже 1%. Основным фактором в развитии эпидемии в Сенегале по-прежнему остается секс-бизнес – например, показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса в Зигиншоре достигает 30%.
- Исследования показывают ранее скрытый аспект эпидемии в **Сенегале** – роль секса между мужчинами как фактора распространения ВИЧ-инфекции. Исследование, проведенное в пяти городских районах (Дакар, Каолак, Мбур, Сен-Луи и Тиес), дало показатель распространенности ВИЧ в 22% среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, большинство из которых (94%) указали, что у них был также секс с женщинами. Эта группа – мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами – может служить потенциальным звеном для передачи ВИЧ женщинам, которым, как правило, грозит низкий уровень инфицирования. Лишь около половины мужчин, включенных в обследование, указали на то, что они пользовались презервативом во время секса с мужчинами или женщинами в предыдущем месяце.
- В **Гвинее** наблюдается одна из самых малых по масштабам эпидемий СПИДа в Африке к югу от Сахары. В 2005 году оценочный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 1,5%, а число людей, живущих с ВИЧ, было около 85 000 человек. Проведенное недавно национальное обследование домохозяйств

показало, что уровни распространенности ВИЧ выше всего в городских районах; они превышали 2% среди взрослых в столице Конакри.

Контактные лица

Ясмин Топор | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 3501 | topory@unaid.org

Софи Бартон-Нотт | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org