

Азия

Общий обзор

- Согласно последним оценкам, в конце 2005 года в Азии число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 8,3 миллиона человек, причем более двух третей из них проживали в одной стране – Индии.
- Более четверти от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Азии, составляли взрослые женщины – 2,4 миллиона. Оценочное число детей, живущих с ВИЧ, составляло 180 000.
- В 2005 году примерно 930 000 человек заразились ВИЧ, в то же время, по оценкам, 600 000 человек умерли от СПИДа.
- Число людей, получающих антиретровирусное лечение, выросло с 70 000 в 2003 году до 180 000 в конце 2005 года. В настоящее время антиретровирусное лечение получает примерно шестая часть (16%) людей, нуждающихся в таком лечении.
- Показатель распространенности ВИЧ снижался в четырех штата **Индии**, в **Камбодже** и в **Таиланде**. В то же время показатель распространенности ВИЧ растет в некоторых странах, включая **Китай**, **Индонезию** и **Вьетнам**; кроме того, имеются признаки вспышек ВИЧ-инфекций в Бангладеш и Пакистане.

Ситуация в странах

- В **Индии**, второй по численности населения стране мира, в 2005 году оценочное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, составляло 5,7 миллиона человек, а национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 0,9%. Показатель распространенности ВИЧ, как правило, выше в промышленно развитых штатах этого полуострова.
- Показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин в возрасте 15–24 лет в штатах Андхра-Прадеш, Карнатака, Махараштра и Тамилнаду снизился с 1,7% в 2000 году до 1,1% в 2004 году. Два последних штата были одними из первых в **Индии**, где начали приниматься меры в ответ на эпидемию, и

нынешние тренды отражают устойчивые усилия по профилактике ВИЧ, которые осуществлялись здесь в последние несколько лет.

- Большинство ВИЧ-инфекций в **Индии** (более 80% всех зарегистрированных случаев СПИДа) обусловлены незащищенными гетеросексуальными контактами. Употребление инъекционных наркотиков является основным фактором развития эпидемий ВИЧ на северо-востоке, причем в некоторых частях страны одни и те же люди зачастую употребляют инъекционные наркотики и покупают сексуальные услуги. В штате Тамилнаду среди некоторых работников секс-бизнеса показатель распространенности ВИЧ достигает 50%. В 2005 году в **Индии** процент людей, нуждающихся в антиретровирусном лечении, был намного ниже 10% (на эту страну приходится более 70% людей, нуждающихся в таком лечении в регионе).
- В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в **Китае**, составляло около 650 000 человек. На потребителей инъекционных наркотиков приходится почти половина (44%) людей, живущих с ВИЧ. Почти половина потребителей инъекционных наркотиков в Китае пользуется общими иглами и шприцами, и каждый десятый практикует сексуальное поведение с высоким уровнем риска.
- По мере того как ВИЧ распространяется от потребителей наркотиков, работников секс-бизнеса и их клиентов на население **Китая** в целом, растет пропорция ВИЧ-инфекций среди женщин. В 2004 году на женщин приходилось 39% всех зарегистрированных случаев ВИЧ, для сравнения двумя годами ранее этот показатель составлял 25%. В некоторых районах провинций Юньнань, Хэнань и Синьцзян показатель распространенности ВИЧ уже превышает 1% среди беременных женщин и лиц, проходящих тестирование до брака и клиническое тестирование на ВИЧ.
- Осуществляемая в **Китае** программа «Четыре бесплатные услуги и одна услуга по уходу», которая предлагает бесплатные антиретровирусные препараты, бесплатные препараты для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, бесплатное школьное образование для детей-сирот, а также уход и экономическую помощь пострадавшим домохозяйствам, может служить моделью для других стран с точки зрения оказания помощи семьям и общинам, пострадавшим от СПИДа. В 2005 году в **Китае** антиретровирусное лечение получали около 25% всех нуждающихся.
- В **Камбодже** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых (1,6%) в 2005 году был на треть ниже, чем в конце 1990-х годов,

главным образом благодаря росту показателей смертности в сочетании с усилиями по профилактике ВИЧ, которые позволили снизить частоту незащищенных платных половых связей. Тем не менее в стране по-прежнему развивается одна из самых тяжелых эпидемий в Азии, причем растет доля женщин, живущих с ВИЧ – по оценкам, в 2003 году они составляли 47% по сравнению с 37% в 1998 году.

- В 2005 году в **Таиланде** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 1,4%. Усилия по профилактике позволили снизить уровни показателя ВИЧ с конца 1990-х годов, благодаря уменьшению числа мужчин, покупающих секс, и распространению практики пользования презервативами. Однако последние исследования показали, что секс до брака становится более распространенным явлением среди молодых тайцев, а в 2005 году более одной трети ВИЧ-инфекций были зарегистрированы среди женщин, которые заразились от своих постоянных партнеров.
- Согласно официальным цифрам, к концу 2005 года, по оценкам, 80 000 ВИЧ-инфицированных **тайцев** получали антиретровирусное лечение. Развертывание программ антиретровирусного лечения в последние годы совпало с резким снижением числа официально регистрируемых смертей от СПИДа – с 5020 в 2004 году до 1640 в 2005 году.
- В **Мьянме** развивается одна из наиболее серьезных эпидемий в регионе. В 2005 году, оценочное число людей, живущих с ВИЧ, составляло 360 000 человек, а национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 1,3%. Однако в последнее время были усилены действия, которые позволили снизить национальный показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин с 2,2% в 2000 году до 1,8% в 2004 году.
- Во **Вьетнаме** ВИЧ распространился на все 59 провинций и все города. В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 260 000 человек, что более чем в два раза превысило число, отмеченное в 2000 году. В 2005 году национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых, по оценкам, составлял 0,5%. Согласно официальным оценкам, ежегодно почти 40 000 человек заражаются ВИЧ. Употребление инъекционных наркотиков и секс-бизнес представляют собой основные факторы, способствующие развитию эпидемии. Показатель распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков увеличился с 9% в 1996 году до 29% в 2002 году и 32% в 2003 году, а

в некоторых городах были зафиксированы уровни инфицирования ВИЧ, достигающие 40%.

- В **Пакистане** в 2005 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 85 000 человек. Стране необходимо улучшить свои усилия по профилактике, с тем чтобы избежать серьезных вспышек ВИЧ-инфекций. В 2004 году почти каждый четвертый потребитель инъекционных наркотиков, прошедший тестирование в Карачи, оказался ВИЧ-инфицированным; менее чем за год до этого тестирование, проведенное среди членов того же сообщества, дало лишь один положительный результат на ВИЧ.
- В **Индонезии** серьезная эпидемия ВИЧ развивается в провинции **Папуа**, где ВИЧ распространился за пределы группы работников секс-бизнеса их клиентов; почти 1% взрослых в пяти деревнях имели положительный результат теста на ВИЧ. Показатель распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков в реабилитационных центрах в Джакарте достигал 48%, и еще более высокие уровни инфицирования были зарегистрированы в Понтианаке на острове **Борнео**.
- В **Бангладеш** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых все еще остается очень низким – менее 0,1%, что отчасти объясняется целенаправленными усилиями по профилактике, которые позволили удержать показатель распространенности ВИЧ ниже 1% среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и среди женщин-работниц секс-бизнеса
- На **Филиппинах** и в **Лаосской Народно-Демократической Республике** развиваются очень ограниченные эпидемии, причем показатели распространенности ВИЧ в обеих странах ниже 0,1%.

Лица для контактов

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org