

## Восточная Европа и Центральная Азия

### Общий обзор

- Эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии продолжают расширяться – в конце 2005 года число людей, живущих с ВИЧ в регионе, составляло около 1,5 миллиона.
- Число новых инфекций увеличилось в двадцать раз менее чем за десятилетие. В 2005 году число новых ВИЧ-инфекций составило 220 000.
- По оценкам, в 2005 году в Восточной Европе и Центральной Азии от СПИДа умерли 53 000 взрослых и детей, что почти в два раза больше чем в 2003 году.
- В 2005 году число женщин, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, по оценкам, составляло 420 000 человек или на треть больше чем в 2003 году.
- Уровень охвата антиретровирусным лечением в регионе остается неадекватным – в 2005 году из 160 000 человек, которые, по оценкам, нуждаются в лечении, такое лечение получали лишь 21 000 человек.
- Более 70% случаев ВИЧ в регионе обусловлено употреблением инъекционных наркотиков, в то же время потребители инъекционных наркотиков составляют лишь 24% людей, получающих лечение.
- В 2005 году в Восточной Европе программы снижения вреда охватывали лишь 9% потребителей инъекционных наркотиков.

### Ситуация в странах

- Самая крупная эпидемия во всей Европе развивается в **Российской Федерации**. В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в этой стране, составляло около 940 000 человек, а национальный показатель распространенности ВИЧ, по оценкам, составлял 1,1%.
- Основной причиной появления новых инфекций в **России** является небезопасная практика употребления инъекционных наркотиков, причем

инъекционные наркотики употребляет большое число людей моложе 30 лет. В Санкт-Петербурге уровни распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков достигают 30%, при этом ВИЧ передается от потребителей инъекционных наркотиков их сексуальным партнерам и растет число инфицированных женщин.

- В **России** особый риск заражения ВИЧ грозит маргинальным группам – исследование, проведенное в центре предварительного заключения в Москве, показало, что уровни распространенности ВИЧ среди задержанных были в 30–120 раз выше, чем среди населения в целом. По оценкам, показатель распространенности ВИЧ в тюрьмах России по крайней мере в четыре раза выше, чем среди широких слоев населения.
- В 2005 году в **России** антиретровирусное лечение получали лишь 5000 из 100 000 человек, которые, по оценкам, нуждаются в таком лечении.
- В **Украине** в 2005 году оценочный показатель распространенности ВИЧ составлял 1,4%, что составляло 410 000 ВИЧ-инфицированных. Развитию эпидемии в **Украине** способствуют небезопасная практика употребления инъекционных наркотиков в сочетании с незащищенными половыми контактами. В Одессе и Симферополе 58%–59% потребителей инъекционных наркотиков имели положительную реакцию на ВИЧ; в Одессе 67% работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики, оказались ВИЧ-инфицированными.
- ВИЧ все чаще передается половым путем – в 2004 году каждый третий случай ВИЧ-инфекции был обусловлен половыми контактами, в то время как в 1999–2003 годах этот показатель составлял 14%. ВИЧ распространился среди широких слоев населения, при этом растет число инфицированных женщин – в 2004 году 42% новых диагнозов ВИЧ в **Украине** были зарегистрированы среди женщин.
- В первые семь месяцев 2005 года 1138 человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом, что составляет почти пятую часть всех зарегистрированных на данный момент смертей, обусловленных СПИДом. Украина начала расширять масштабы лечения при ВИЧ, при этом число людей, получающих антиретровирусное лечение, увеличилось менее чем с 200 в июле 2004 года до более 3000 в декабре 2005 года.
- Эпидемия нарастает в **Беларуси**, где, по оценкам, в 2005 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 20 000 человек, а национальный показатель

распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 0,3%. Наибольшее число новых диагнозов обусловлено передачей ВИЧ половым путем (55% в 2004 году).

- В **Узбекистане**, где развитию эпидемии способствуют употребление инъекционных наркотиков и платный секс, число новых диагнозов ВИЧ увеличилось с 28 в 1999 году до 2016 в 2004 году.
- В **Казахстане** в 2005 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ, составляло 12 000 человек. Национальный показатель распространенности ВИЧ составлял 0,1%, однако очень высокие показатели распространенности ВИЧ были обнаружены среди потребителей инъекционных наркотиков (56% в ходе исследования, проведенного недавно в городе Кашгаре).
- Эпидемия в **Таджикистане** быстро растет, хотя ее масштабы намного меньше. До 2004 года ежегодное число диагнозов ВИЧ было менее 50, но в 2004 году оно составило уже 198.
- Эпидемии на Кавказе растут более медленными темпами по сравнению с различными эпидемиями в других республиках бывшего Советского Союза. Однако условия в **Азербайджане, Армении и Грузии** способствуют росту ВИЧ.
- В **Армении** основным путем передачи ВИЧ является употребление инъекционных наркотиков, в то же время в столице **Азербайджана** Баку был установлен значительный показатель распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков и работников секс-бизнеса.
- Эпидемии в Юго-Восточной Европе являются еще более незаметными, однако и здесь употребление инъекционных наркотиков и рискованное сексуальное поведение могут привести к вспышкам ВИЧ. Наиболее пострадавшей страной этого субрегиона является **Румыния**, где на конец 2004 года кумулятивное число ВИЧ-инфекций составляло 6200 и где большинство новых инфекций обусловлено незащищенными половыми контактами.

#### **Лица для контактов**

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)