

Faits et chiffres mondiaux

06

- Jusqu'ici, quelque 65 millions de personnes ont été infectées par le VIH, et le SIDA a tué plus de 25 millions de personnes depuis qu'il a été identifié pour la première fois en 1981. La vaste majorité des 38,6 millions de personnes vivant avec le VIH en 2005 ne connaissaient pas leur sérologie VIH. Le SIDA figure parmi les plus grands problèmes de développement et de sécurité auxquels le monde soit confronté aujourd'hui.
- En 2005 le SIDA a entraîné 2,8 millions de décès et plus de 4 millions de personnes ont contracté une infection par le virus.
- Les femmes représentent près de la moitié – 17,3 millions – de toutes les personnes vivant avec le virus ; 13,2 millions d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne (soit 76% de toutes les femmes vivant avec le VIH).
- L'Afrique subsaharienne reste la région la plus durement touchée au monde. Deux tiers de toutes les personnes vivant avec le VIH se trouvent dans cette région, où 24,5 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2005.
- Des épidémies toujours plus importantes se déroulent en Europe orientale et en Asie centrale où 220 000 personnes ont contracté une infection à VIH en 2005.
- On a relevé une baisse de la prévalence du VIH au Kenya, au Zimbabwe, dans les zones urbaines d'Haïti et du Burkina Faso, ainsi que dans quatre états indiens, dont le Tamil Nadu.

Statistiques régionales

	Personnes vivant avec le VIH	Nouvelles infections en 2005	Décès dus au SIDA en 2005	Prévalence chez l'adulte %
Afrique subsaharienne	24,5 millions	2,7 millions	2 millions	6,1%
Asie	8,3 millions	930 000	600 000	0,4%
Amérique latine	1,6 million	140 000	59 000	0,5%
Amérique du Nord, Europe occidentale et centrale	2 millions	65 000	30 000	0,5%
Europe orientale et Asie centrale	1,5 million	220 000	53 000	0,8%
Moyen-Orient et Afrique du Nord	440 000	64 000	37 000	0,2%
Caraïbes	330 000	37 000	27 000	1,6%
Océanie	78 000	7200	3400	0,3%
Total	38,6 millions	4,1 millions	2,8 millions	1%

Prévention

- On compte chaque année plus de nouvelles infections à VIH que de décès liés au SIDA et, au fur et à mesure que s'accroît le nombre de personnes qui contractent une infection à VIH, le nombre de personnes qui meurent de maladies associées au SIDA augmentera.
- A l'échelle mondiale, moins d'une personne sur cinq exposées au risque d'infection à VIH peut accéder à des services essentiels de prévention. Moins d'une personne sur huit souhaitant faire un test VIH dans le monde est en mesure de le faire.
- Chaque jour, 1500 enfants sont infectés par le VIH dans le monde, et la majeure partie d'entre eux sont des nouveau-nés. En 2005, 9% seulement des femmes enceintes dans les pays à faible ou moyen revenu se sont vues offrir des services de prévention de la transmission du virus à leur nouveau-né.
- Pour vaincre l'épidémie, il faut élargir et intensifier les efforts de prévention du VIH dans le cadre d'une riposte globale qui étend simultanément l'accès aux traitements et à la prise en charge.
- L'extension des stratégies connues de prévention dans 125 pays à faible ou moyen revenu permettrait d'éviter quelque 28 millions de nouvelles infections entre 2005 et 2015, soit plus de la moitié de celles qui devraient survenir au cours de cette période selon les projections, et d'économiser 24 milliards de dollars en coûts de traitement.
- L'extension simultanée de la prévention et des traitements permettrait d'éviter 29 millions de nouvelles infections à l'horizon 2020.

Traitement

- Selon le dernier rapport de l'ONUSIDA/OMS relatif à l'initiative '3 millions d'ici 2005', quelque 1,3 million de personnes vivant avec le VIH bénéficient d'une thérapie par les ARV dans les pays à faible ou moyen revenu. C'est-à-dire que 20% des personnes ayant besoin d'un traitement le reçoivent aujourd'hui.
- Le nombre de personnes sous traitement antirétroviral dans les pays à faible ou moyen revenu a triplé depuis la fin de 2001.

Région géographique	Estimation du nombre de personnes sous thérapie antirétrovirale, décembre 2005	Estimation du nombre personnes ayant besoin d'une thérapie antirétrovirale, décembre 2005	Couverture de la thérapie antirétrovirale, décembre 2005
Afrique subsaharienne	810 000	4 700 000	17%
Amérique latine et Caraïbes	315 000	465 000	68%
Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est	180 000	1 100 000	16%
Europe et Asie centrale	21 000	160 000	13%
Moyen-Orient et Afrique du Nord	4000	75 000	5%
Total	1 330 000	6,5 millions	20%

Note: Certains chiffres ne s'additionnent pas car ils ont été arrondis

Besoins en matière de ressources

- En 2005, on estime que US\$ 8,3 milliards ont été disponibles pour des activités de lutte contre le SIDA ; ce chiffre devrait monter à US\$ 8,9 milliards en 2006 et US\$ 10 milliards en 2007. Mais il n'atteint pas les montants qui seraient nécessaires -- US\$ 14,9 milliards en 2006, US\$ 18,1 milliards en 2007 et US\$ 22,1 milliards en 2008.
- Pour le traitement et la prise en charge, environ 55% de ces ressources seront nécessaires en Afrique, 20% en Asie et dans le Pacifique, 17% en Amérique latine et aux Caraïbes, 7% en Europe orientale, 1% en Afrique du Nord et au Proche-Orient.

Besoins en matière de ressources pour combattre le SIDA (en milliards de dollars)

	2006	2007	2008	Totaux pour 2006–2008*
Prévention	8,4	10,0	11,4	29,8
Traitement et prise en charge	3,0	4,0	5,3	12,3
Orphelins et enfants vulnérables	1,6	2,1	2,7	6,4
Coûts programmatiques	1,5	1,4	1,8	4,6
Ressources humaines	0,4	0,6	0,9	1,9
Total	14,9	18,1	22,1	55,1

Contact

Bureau de presse ONUSIDA | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | www.unaids.org