

Oceanía

Panorama general

- Se estima que en Oceanía vivían 78 000 personas con el VIH a final de 2005.
- La prevalencia regional del VIH en adultos se mantuvo en el 0,3% durante 2005. Según las estimaciones, el pasado año fallecieron en Oceanía 3400 personas por causa de enfermedades relacionadas con el SIDA y otras 7200 contrajeron la infección.
- El tratamiento se ha generalizado en los países con epidemias maduras, lo que ha contribuido a mantener relativamente bajo el número de fallecimientos relacionados con el SIDA.

Tendencias en los países

- La epidemia de **Papua Nueva Guinea** representa más del 90% de todas las infecciones por el VIH comunicadas hasta ahora en Oceanía, y sigue creciendo a un ritmo alarmante. Los diagnósticos de VIH han ido aumentando alrededor del 30% anual desde 1997. Se calcula que 60 000 habitantes de **Papua Nueva Guinea** vivían con el VIH en 2005 y que la prevalencia del virus se mantenía en el 1,8%.
- Las normas socioculturales en **Papua Nueva Guinea** discriminan fuertemente a las mujeres, y se han comunicado altos niveles de violencia sexual contra ellas. Son habituales tanto las relaciones sexuales remuneradas como las parejas ocasionales, y el uso de preservativos tiende a ser errático. En 2004 resultaron VIH-positivas el 20% de las personas que solicitaron tratamiento por infecciones de transmisión sexual en la capital, Port Moresby.
- En **Australia** se calcula que 16 000 adultos y niños vivían con el VIH en 2005. Después de disminuir a finales de los años 1990, el número anual de nuevos

diagnósticos de VIH se está acercando otra vez a los niveles previos, con unos 820 casos en 2004. Están aumentando las nuevas infecciones por el VIH (atribuibles en gran medida a las relaciones sexuales sin protección, sobre todo entre varones), lo que refleja plausiblemente una reavivación de comportamientos sexuales de riesgo.

- Aunque, en general, las tendencias nacionales de la infección por el VIH parecen ser similares entre indígenas y no indígenas, un estudio reciente ha puesto de manifiesto discrepancias notables en **Australia** occidental. Durante el periodo 1985-2002, los casos de VIH notificados disminuyeron entre los australianos no indígenas pero aumentaron entre los varones y mujeres indígenas.
- Los nuevos diagnósticos anuales en **Nueva Zelandia** se han más que duplicado desde 1999 --de menos de 80 a 183 en 2005--, pero la prevalencia nacional del VIH en adultos sigue siendo muy baja (inferior al 0,2%). Esta tendencia reciente puede atribuirse en gran parte al incremento en los diagnósticos de VIH entre varones que tienen relaciones sexuales con varones.
- Los niveles de infección por el VIH son bajos en el resto de Oceanía, pero esto podría cambiar. Se ha comprobado que más del 40% de las mujeres embarazadas en **Vanuatu** y el 43% en Apia, la capital de **Samoa**, tienen como mínimo una infección de transmisión sexual. En Dili (**Timor-Leste**), el 60% de los profesionales del sexo resultaron positivos para una o más infecciones de transmisión sexual, al igual que casi el 30% de los taxistas y varones que tienen relaciones sexuales con varones.

Contacto

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / bartonknotts@unaids.org.