



## Avances en los países

El Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006 del ONUSIDA presenta datos de los países sobre los avances realizados hacia la consecución de los objetivos establecidos en la Declaración de compromiso de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en 2001. Los datos se basan en los informes recibidos de 126 países y de grupos de la sociedad civil en más de 30 de ellos.

### Avances

- Se han realizado avances importantes desde el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en 2001, pero todavía existe una diversidad extraordinaria en la respuesta al VIH entre los países y regiones.
- Mientras que algunos países seleccionados han alcanzado hitos y objetivos fundamentales para 2005, muchos otros no han logrado cumplir las promesas especificadas en la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA, aprobada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2001.
- Algunos países han conseguido avances importantes en la ampliación del acceso al tratamiento, pero han tenido menos éxito en sus esfuerzos por ampliar los programas de prevención del VIH; a la inversa, otros países que están experimentando ahora una reducción en la prevalencia nacional del VIH han realizado pocos progresos para asegurar que dispongan de tratamiento todos aquellos que lo necesitan.
- En la mayoría de los países existe actualmente un fundamento sólido sobre el que construir una respuesta eficaz al SIDA, con un compromiso político creciente y una mayor coordinación entre los asociados a nivel de país.
- La financiación anual para el SIDA en los países de ingresos bajos y medianos se ha multiplicado por 28 desde la creación del ONUSIDA en 1996, de US\$ 300 millones a US\$ 8300 millones en 2005.
- El gasto público interno de los gobiernos también ha aumentado significativamente en los países de África subsahariana de ingresos bajos, aunque lo ha hecho de forma más moderada en los países de ingresos medianos. En 2005, los recursos internos llegaron a US\$ 2500 millones.
- El acceso al tratamiento se ha ampliado de forma espectacular durante los últimos cinco años en los países en desarrollo: de 240 000 personas que recibían terapia antirretrovírica en 2001 a 1,3 millones en 2005. Hasta la fecha, 21 países han cumplido o superado los objetivos estipulados en la iniciativa «Tres millones para 2005» de proporcionar tratamiento como mínimo al 50% de las personas que lo necesitan.

- En más de 70 países encuestados, el número de personas que utilizaron servicios de asesoramiento y pruebas del VIH se cuadruplicó en los últimos cinco años, de aproximadamente cuatro millones en 2001 a 16,5 millones en 2005.
- En 58 países que aportaron datos, el 74% de las escuelas primarias y el 81% de las escuelas secundarias ofrecen actualmente educación sobre el SIDA.
- En ocho de 11 países subsaharianos estudiados disminuyó el porcentaje de jóvenes que tienen relaciones sexuales antes de los 15 años y aumentó el uso de preservativos durante los últimos cinco años.
- Seis de 11 países africanos fuertemente afectados por el SIDA comunicaron un descenso del 25% o superior en la prevalencia del VIH entre individuos de 15-24 años de sus respectivas capitales.
- Algunos países han alcanzado una cobertura de casi el 60% de las mujeres embarazadas VIH-positivas que reciben profilaxis antirretrovírica para prevenir la transmisión maternoinfantil.
- En la mayoría de los países, la sangre utilizada para transfusiones se analiza ahora de forma sistemática para detectar el VIH.

## **Retos**

- Los programas de prevención del VIH no están llegando a las personas de máximo riesgo. Siguen siendo insuficientes los esfuerzos por aumentar los conocimientos sobre el SIDA entre los jóvenes.
- Aunque la Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA estipulaba que el 90% de los jóvenes debían estar bien informados sobre el SIDA para 2005, las encuestas indican que menos del 50% han alcanzado niveles adecuados de conocimiento.
- En los países de ingresos bajos y medianos, sólo el 9% de los varones que tienen relaciones sexuales con varones recibió algún tipo de servicio de prevención del VIH en 2005, al igual que menos del 20% de los consumidores de drogas intravenosas. La cobertura era inferior al 10% en Europa oriental y Asia central, donde el consumo de drogas es un impulsor importante de la epidemia.
- Los servicios para prevenir la infección por el VIH en lactantes no se han ampliado con la misma rapidez que los programas para proporcionar terapia antirretrovírica, de modo que en los países de ingresos bajos y medianos sólo tiene cobertura el 9% de las mujeres embarazadas.
- Los informes de la sociedad civil de más de 30 países en desarrollo indican que persisten el estigma y la discriminación contra la personas que viven con el VIH.
- Los gobiernos nacionales, asociados internacionales y comunidades no están proporcionando atención y apoyo adecuados a los 15 millones de huérfanos a causa del SIDA, ni a los millones de otros niños vulnerables como consecuencia de la epidemia.
- La cobertura antirretrovírica varía considerablemente dentro de las regiones. En África subsahariana, la cobertura del tratamiento oscila entre el 3% en la República Centroafricana y el 85% en Botswana. Mientras que en la Argentina, el Brasil y

Venezuela más del 80% de las personas están recibiendo tratamiento, y en el Paraguay y Bolivia sólo tienen acceso a terapia el 29% y 37%, respectivamente. En la India, que pronto puede tener la mayor población mundial de personas que viven con el VIH, la cobertura antirretrovírica era tan sólo del 7% en 2005. En la Federación de Rusia, tenía acceso a tratamiento el 5% de las personas que lo necesitaban.

**Contacto**

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org).