

Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

Азия

Региональный обзор

- По сравнению с 2001 годом в 2007 году в Восточной Азии число новых ВИЧ-инфекций выросло почти на 20%.
- Самой высокой распространенность ВИЧ является в Юго-Восточной Азии, при этом наблюдается широкое разнообразие тенденций роста эпидемии. **Мьянма, Таиланд и Камбоджа** демонстрируют спад в распространенности, но в **Индонезии** и **Вьетнаме** эпидемия растет особенно высокими темпами.
- Хотя доля людей, живущих с ВИЧ, в **Индии** меньше, чем считалось ранее, эпидемия по-прежнему затрагивает большое число людей.

Страновые данные и тенденции

- В **Китае** в 2006 году насчитывалось 700 000 людей, живущих с ВИЧ. Считается, что менее половины были инфицированы в результате употребления инъекционных наркотиков, и такой же является доля лиц, заразившихся во время незащищенного секса.
- Важным аспектом эпидемии ВИЧ в **Китае** является совмещение употребления инъекционных наркотиков и секс-бизнеса, при этом число женщин, употребляющих инъекционные наркотики, растет, и в некоторых местах до половины тех, кто занимается этим, также продают сексуальные услуги. Между тем, еще более усугубляют положение низкие уровни знаний и просвещения в области ВИЧ, низкий уровень пользования презервативами и нелегальный статус секс-бизнеса, в результате чего работницы секс-бизнеса подвергаются высокому риску заражения ВИЧ.
- в **Китае** уделяется относительно небольшое внимание распространению ВИЧ среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами. По некоторым оценкам, небезопасный секс между мужчинами может быть причиной 7% случаев ВИЧ-инфекции. В нескольких исследованиях указываются модели поведения, способные привести к расширению уязвимости к ВИЧ в сетях, практикующих секс между мужчинами, и за их пределами.
- Усилия по снижению вреда в **Китае**, хотя все еще частичные и разбросанные, начинают демонстрировать положительные изменения в рискованном поведении. Проекты по содействию распространению презервативов среди секс-работников и их клиентов приносят результаты, при этом в некоторых участвующих городах отмечаются большие изменения в пользовании презервативами, например, в городе Лучжоу (провинция Гуанси) за два года уровень пользования презервативами среди секс-работников вырос с 48% до 80%.

- В целом в последние годы **Китай** усилил свои действия в ответ на эпидемию ВИЧ. Бесплатное тестирование на ВИЧ можно пройти на более чем 3 000 участков во всей 31 провинции, и, по оценкам, в конце 2006 года антиретровирусное лечение получали 30 000 пациентов.
- Пересмотренные оценки по ВИЧ для **Индии** являются результатом нескольких ключевых улучшений, к которым относятся расширенная и улучшенная система надзора за ВИЧ и адаптация методики оценки, позволившая включить новые данные. Одним из главных улучшений стало национальное обследование домашних хозяйств, проведенное в 2005 и 2006 годах, которое охватило около 100 000 домашних хозяйств и впервые включало в себя компонент по ВИЧ.
- В нескольких штатах **Индии** данные свидетельствуют о высокой распространенности ВИЧ среди секс-работников и о возможном росте распространенности ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, и мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами. Хотя ВИЧ распространился среди широкого населения и в некоторых штатах затрагивает все большее число женщин, которые, как считалось, подвергаются низкому риску инфицирования, эпидемия в стране в основном является результатом передачи ВИЧ внутри групп населения повышенного риска, между ними и в их непосредственной близости. Кроме того, значительным и еще недостаточно исследованным аспектом эпидемии ВИЧ в Индии является секс между мужчинами.
- В соседнем **Пакистане** плохое знание вопросов ВИЧ и широко распространенное рискованное поведение в группах повышенного риска обеспечивают потенциал для дальнейшего роста эпидемии. В одном исследовании в Карачи было установлено, что распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, выросла с менее 1% в начале 2004 года до 26% в марте 2005 года. Также вызывает беспокойство потенциальная роль трудящихся-мигрантов, причиной чего главным образом являются неженатые рабочие-мигранты мужского пола, занимающиеся незащищенным коммерческим сексом. Если уровни ВИЧ-инфекции среди секс-работников повысятся, эти рабочие могут обеспечить потенциальный мост для передачи ВИЧ широкому населению. По оценкам, в 2006 году профилактическими мероприятиями в связи с ВИЧ было охвачено лишь 5% работниц секс-бизнеса.
- Хотя в **Непале** и **Бангладеш** наблюдаются относительно небольшие эпидемии ВИЧ, рискованное поведение, распространенное среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, и секс-работников, может способствовать более широкой передаче ВИЧ.
- Во **Вьетнаме** усилия по профилактике ВИЧ начинают давать результаты. Результатом проектов по содействию распространению презервативов на уровне общины в пяти провинциях стало более безопасное поведение в группе работающих на улице секс-работников и их клиентов, при этом уровень пользования презервативами утроился, с приблизительно 20% в 2001 году до 60% в 2004 году, а уровень пользования презервативами с мужьями и «друзьями» за тот же период более чем удвоился, с 16% до 38%.
- Эпидемия ВИЧ в **Индонезии** является одной из наиболее быстро развивающихся в Азии. Эпидемия ВИЧ, которая первоначально в основном концентрировалась среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, в Бали, Джакарте и Западной Яве, в настоящее время охватывает многих из их сексуальных

партнеров, не употребляющих инъекционные наркотики, а также заключенных и секс-работников и их клиентов и распространилась на 32 провинции; тогда как в 2000 году случаи ВИЧ или СПИДа регистрировались лишь в два раза меньшем числе провинций.

- Одно исследование 2007 года в **Камбодже** доказывает, что хорошо нацеленные и последовательные усилия по профилактике могут помочь повернуть вспять распространение ВИЧ-инфекции. В национальном масштабе в 2006 году распространенность ВИЧ среди взрослых, по оценкам, упала до 0,9%, ниже, чем пересмотренные оценки на уровне 1,2% в 2003 году и пиковое значение в 2% в 1998 году. В прошедшие десять лет важным фактором был значительный рост показателей пользования презервативами во время коммерческого секса в публичных домах, а также отмечаемое в сообщениях сокращение фактического числа мужчин, покупающих сексуальные услуги.
- В **Таиланде** число ВИЧ-инфекций продолжает уменьшаться, однако существенная доля новых инфекций отмечается в группах риска: среди секс-работников, людей, употребляющих инъекционные наркотики, и мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами. По одним оценкам, в 2005 году на долю последней группы приходилось до одной пятой (21%) новых ВИЧ-инфекций.
- В **Мьянме** эпидемия демонстрирует признаки снижения, при этом распространенность ВИЧ среди беременных женщин в дородовых клиниках упала с 2,2% в 2000 году до 1,5% в 2006 году. Несмотря на общее снижение распространенности, беспокойность вызывают высокие уровни инфекции, установленные среди молодежи (2,2% in 2005 году), как и постоянно повышенная распространенность ВИЧ среди ключевых групп населения повышенного риска.
- В **Малайзии** эпидемия ВИЧ главным образом концентрируется в группе, практикующей небезопасное употребление инъекционных наркотиков, и, по оценкам, на сегодняшний день более двух третей случаев ВИЧ-инфекции отмечено среди людей, употребляющих инъекционные наркотики.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org