

Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

Карибский бассейн

Региональный обзор

- Национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения стабилизировался в ряде стран Карибского бассейна, включая **Доминиканскую Республику и Гаити**, где в некоторых городских районах отмечается его снижение.
- В Карибском бассейне СПИД по-прежнему является одной из ведущих причин смерти среди людей в возрасте 25 – 44 лет, однако число ВИЧ-положительных людей, у которых развивается СПИД и которые в конце концов умирают от связанных со СПИДом болезней, сокращается, возможно, благодаря расширению антиретровирусного лечения.
- По оценкам, к концу 2006 году антиретровирусное лечение в регионе начали получать 28 000 людей, живущих с ВИЧ, что почти в пять раз больше, чем менее трех лет назад.
- Главным способом передачи ВИЧ в этом регионе являются половые отношения, при этом одним из ключевых факторов, способствующих распространению ВИЧ, являются незащищенные половые отношения между секс-работниками и клиентами. В Карибском бассейне эпидемии происходят на фоне высоких уровней бедности и безработицы, гендерного и иного неравенства и значительной стигмы – все это может способствовать быстрому распространению ВИЧ, а также препятствовать усилиям по установлению контроля над эпидемией.
- Высокому риску ВИЧ-инфицирования в регионе подвергаются молодые девушки. Одним из важных факторов, способствующих их восприимчивости, является общепринятая практика, когда молодые девушки вступают в отношения с более старшими по возрасту мужчинами, которые в силу своего возраста имеют больше шансов быть ВИЧ-инфицированными.
- Благодаря расширению программ профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в некоторых странах, включая **Барбадос, Гайану и Ямайку**, значительно сократился показатель передачи ВИЧ младенцам.
- В Карибском бассейне секс между мужчинами является значительным, но в основном скрытым аспектом эпидемии. Хотя в отношении этой группы проводилось мало исследований, имеющиеся данные позволяют предположить, что на долю небезопасного секса между мужчинами приходится около одной десятой зарегистрированных случаев ВИЧ. Мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, подвергаются большой стигматизации, а также социальному и институциональному притеснению. Немного существует связанных с ВИЧ программ, которые их охватывают, что еще более усугубляет их уязвимость к эпидемии.
- В недавнем исследовании в **Тринидаде и Тобаго** было установлено, что распространенность ВИЧ среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, составляет 20%, при этом 25% из них заявили, что они также

Объединим мир против **СПИДа**

регулярно вступают в половые отношения с женщинами.

Страновые данные и тенденции

- Хотя самое большое бремя ВИЧ-инфекции в Карибском бассейне несет **Гаити**, национальная распространенность здесь стабилизировалась, и среди беременных женщин отмечены значительные успехи: распространенность ВИЧ снизилась с 5,9% в 1996 году до 3,1% в 2004 году. Считается, что эта тенденция связана со снижением уровней инфицирования в столице страны Порт-о-Пренсе и других городских районах, поскольку в сельских общинах страны сокращения числа ВИЧ-инфекций не наблюдается, и, например, использование презервативов здесь является скорее исключением, чем нормой. Молодые люди, которые сообщают, что пользовались презервативом с нерегулярным партнером, составляют здесь меньшинство. В одном исследовании лишь одна из четырех молодых женщин и четыре из десяти молодых мужчин заявили, что последний раз, когда они имели половые отношения, они использовали защиту.
- Лучше обстоит дело с предоставлением лечения, в этой связи **Гаити** является убедительным доказательством того, что антиретровирусная терапия может эффективно предоставляться в условиях бедности. Охват продолжает оставаться низким – в 2006 году лечение получали лишь 39% нуждающихся, - однако одно исследование в Порт-о-Пренсе показало, что среди взрослых, имевших доступ к антиретровирусной терапии, через год после начала терапии 87% были все еще живы, по сравнению с 30% взрослых, не имевших доступа. Среди инфицированных детей через год после начала лечения в живых оставались 98%.
- В **Доминиканской Республике** заметным фактором, способствующим росту эпидемии, является коммерческий секс. Как представляется, усилия по обеспечению секс-работникам возможности защищать себя (и своих клиентов) от ВИЧ-инфекции имеют успех, особенно в главных городских и туристских центрах. В исследовании в 2006 году было установлено, что использование презервативов среди секс-работников, участвовавших в профилактическом проекте в столице страны Санто-Доминго, за 12 месяцев увеличилось с 75 до 94%. Тем не менее, усилия, предпринимаемые в стране в целях профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, продолжают оставаться недостаточными. Несмотря на то что около 95% деторождений происходит в государственных больницах, четыре из десяти ВИЧ-положительных беременных женщин не получают лечения для сокращения риска передачи от матери ребенку.
- В **Ямайке** в настоящее время 90% беременных женщин, посещающих государственные дородовые клиники, проверяются на ВИЧ – семикратное увеличение по сравнению с 2002 годом, - как и более половины тех, кто посещает клиники для инфекций, передающихся половым путем. По оценкам, антиретровирусное лечение для профилактики передачи ВИЧ своим новорожденным детям получают 80% ВИЧ-положительных матерей, посещающих государственные дородовые клиники, по сравнению с 65% в 2005 году.
- Положительные результаты расширения доступа к антиретровирусному лечению в **Барбадосе** – где с 2002 года оно предоставляется бесплатно – очевидны, при этом за период с 2001 по 2006 годы число смертей по причине СПИДа в год сократилось на 85%. Точно так же, до менее 3% снизились показатели передачи ВИЧ от матери ребенку, что является успехом, сопоставимым с достижениями в промышленно развитых странах.
- Программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в **Гайане** также расширяется, причем такие услуги предоставляют примерно 94 участка в восьми

регионах. В одном обследовании в 2006 году было установлено, что если беременным женщинам предлагаются услуги по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, то около 80% из них соглашаются их получать. В других обследованиях и исследованиях были выявлены высокие уровни распространенности среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, работниц секс-бизнеса и некоторых групп мигрантов. В целом, похоже, что эпидемия в стране распространяется главным образом в результате незащищенных половых отношений.

- В отличие от других частей этого региона, на **Бермудских островах** и в **Пуэрто-Рико** ключевым фактором, способствующим распространению эпидемии, является употребление инъекционных наркотиков. По-прежнему очень высокая распространенность ВИЧ наблюдается среди потребителей инъекционных наркотиков в **Пуэрто-Рико**, где показатель ВИЧ-инфекции (26 на 100 000 населения) в два раза выше, чем на материковой части Соединенных Штатов Америки, и где более двух третей случаев ВИЧ-инфекции регистрируется среди мужчин.
- Самой маленькой эпидемией в регионе продолжает оставаться эпидемия на **Кубе**, где, по оценкам, национальный уровень распространенности ВИЧ среди взрослых составляет менее 0,1%. Большинство регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции приходится на долю мужчин (более 80%), хотя число новых ВИЧ-инфекций среди женщин увеличивается – 202 в 2006 году; что представляет собой увеличение на 30%, по сравнению с 2005 годом. На **Кубе** тестирование на ВИЧ проходят все беременные женщины, и те, у кого результаты теста оказываются положительными, получают антиретровирусные препараты для сокращения риска передачи ВИЧ их новорожденным детям.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org