

## Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

### Восточная Европа и Центральная Азия

#### Региональный обзор

- Эпидемии ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии главным образом сконцентрированы среди потребителей инъекционных наркотиков, секс-работников, их соответствующих сексуальных партнеров и, в меньшей степени, среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами. Из новых случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 2006 году, для которых имелась информация о способе передачи, 62% произошли в результате употребления инъекционных наркотиков и 37% - в результате незащищенного секса между мужчинами и женщинами. Среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, было зарегистрировано менее 1% новых диагнозов ВИЧ по всему региону, хотя реальная роль, которую секс между мужчинами играет в некоторых эпидемиях в регионе, неизвестна.
- Почти 90% впервые зарегистрированных диагнозов ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии в 2006 году приходится на **Российскую Федерацию и Украину**.
- Что касается других частей региона, то годовые показатели впервые регистрируемых диагнозов ВИЧ также растут в **Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Узбекистане**, где сейчас наблюдается самая крупная эпидемия в Центральной Азии.
- Около 40% впервые регистрируемых случаев ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии в 2006 году приходилось на женщин. Считается, что в **Российской Федерации и Украине** около двух третей растущего числа случаев ВИЧ среди женщин являются прямым или косвенным (женщины инфицируются от сексуального партнера, употребляющего инъекционные наркотики) результатом употребления инъекционных наркотиков.
- В этом регионе продолжают осуществляться усилия по инициированию и, в некоторых случаях, по расширению программ снижения вреда. В **Российской Федерации** в 2007 году действовало более 50 проектов обмена игл и шприцев, а в **Казахстане** начиная с 2005 года осуществляется общенациональная программа, состоящая из более чем 120 участков по снижению вреда. Пилотные проекты для лечения с помощью заместителей опиоидов начинают осуществляться в некоторых странах, включая **Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова и Узбекистан**.

#### Страновые данные и тенденции

- Эпидемия ВИЧ в **Российской Федерации** продолжает расти, хотя и не так быстро, как в конце 1990-х годов, и в основном концентрируется в городских и промышленных центрах страны. Почти 60% случаев ВИЧ-инфекции,

зарегистрированных на сегодняшний день, имели место в 10 крупных городах и регионах, включая такие города, как Санкт-Петербург и Москва.

- Главным способом передачи ВИЧ в **Российской Федерации** продолжает оставаться употребление инъекционных наркотиков. В 2006 году из впервые регистрируемых случаев ВИЧ, где способ передачи был известен, две трети (66%) являлись результатом употребления инъекционных наркотиков и около одной трети (32%) – результатом незащищенных гетеросексуальных половых отношений. В 2006 году на долю женщин приходилось около 44% впервые регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции.
- В 2006 году менее 1% впервые регистрируемых случаев ВИЧ в **Российской Федерации** — когда способ передачи был известен — являлись результатом небезопасного секса между мужчинами. Эта цифра может занижать масштабы передачи ВИЧ между мужчинами, имеющими половые отношения с мужчинами, поскольку последние исследования обнаруживают значительное число случаев рискованного поведения, способного увеличивать опасность ВИЧ-инфицирования, например, нечастое использование презервативов и употребление инъекционных наркотиков.
- В **Украине** распространенность ВИЧ среди взрослых выше, чем в любой другой стране в Европе и Центральной Азии — начиная с 2001 года годовой показатель диагнозов ВИЧ более чем удвоился. Главным способом передачи ВИЧ в **Украине** продолжает оставаться употребление инъекционных наркотиков, при этом число людей, употребляющих инъекционные наркотики, которым был впервые поставлен диагноз ВИЧ, увеличилось с 3 964 в 2001 году до 7 127 в 2006 году. В первой половине 2007 года среди потребителей инъекционных наркотиков было зарегистрировано 3 639 новых случаев ВИЧ-инфекции, что представляет собой самый большой рост среди всех групп населения в Украине.
- **Украина** предпринимает существенные шаги по ограничению передачи ВИЧ от матери ребенку. В 2006 году тестирование на ВИЧ прошли 95% всех беременных женщин, и 93% ВИЧ-положительных женщин, родивших ребенка, получали антиретровирусную профилактику в целях предотвращения передачи ВИЧ во время беременности и родов.
- Самая крупная эпидемия ВИЧ в Центральной Азии отмечается в **Узбекистане**, и учитывая сообщения о высоком уровне употребления инъекционных наркотиков и половых отношений с нерегулярными партнерами, она скорее всего будет продолжать расти. В период с 1999 по 2003 годы число впервые регистрируемых диагнозов ВИЧ росло экспоненциально, с 28 до 1 836. С тех пор число впервые регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции росло более медленными темпами и в 2006 году достигло 2 205.
- В 2006 году две трети впервые регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции в **Казахстане** приходилось на долю людей, употребляющих инъекционные наркотики. Эпидемии ВИЧ в **Кыргызстане** и **Таджикистане** также главным образом основываются на употреблении инъекционных наркотиков. В **Туркменистане** официально зарегистрировано только два случая ВИЧ-инфекции, и о потенциале передачи ВИЧ в этой стране известно мало.
- Как представляется, эпидемия ВИЧ в **Беларуси** стабилизировалась, при этом начиная с 2003 года годовое число впервые регистрируемых диагнозов ВИЧ лишь

слегка изменяется, в пределах от 713 до 778. Большинство случаев ВИЧ-инфекции регистрируются в городских районах и вокруг них, таких как столица страны, Минск, и в основном среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. Растет и число женщин, затронутых ВИЧ. Во время широкомасштабного тестирования на ВИЧ в 2006 году 80% новых случаев ВИЧ были результатом небезопасных половых отношений, что является ростом по сравнению с 2003 годом, когда этот показатель составлял около 56%.

- По сравнению с 2003 годом число впервые регистрируемых случаев ВИЧ в **Республике Молдова** более чем удвоилось, и в 2006 году их общее число составляло 621. Почти 60% из них являлись результатом незащищенных половых отношений.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)