

## Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

### Латинская Америка

#### Региональный обзор

- В целом эпидемии ВИЧ в Латинской Америке остаются стабильными, но передача ВИЧ продолжает иметь место среди групп населения с повышенным риском инфицирования. К ним относятся секс-работники и мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами — группы, которые еще не охвачены надлежащим образом услугами по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке.
- В целях обеспечения лучшего понимания нынешних тенденций роста эпидемии во многих странах этого региона необходимо совершенствовать усилия по надзору за ВИЧ.

#### Страновые данные и тенденции

- Хотя в **Бразилии** проживает около одной трети всех людей, живущих с ВИЧ, в Латинской Америке, благодаря одновременному нацеливанию усилий на обеспечение доступа как к усилиям по профилактике ВИЧ, так и к усилиям по лечению удается сохранять стабильность эпидемии в стране. Между тем, за период с 1996 по 2002 годы благодаря широкому доступу к антиретровирусному лечению показатели смертности от СПИДа снизились наполовину.
- В **Бразилии** постоянно растет число женщин, инфицируемых ВИЧ, главным образом в результате контактов со своими сексуальными партнерами мужского пола, которые могли получить инфекцию через посредство незащищенного секса с другим мужчиной или другой женщиной, или в результате использования нестерильного инъекционного инструментария.
- В **Бразилии** на долю незащищенного секса между мужчинами приходится около половины ВИЧ-инфекций, которые передаются половым путем.
- Среди заключенных в **Бразилии** была выявлена высокая распространенность ВИЧ. Почти 6% заключенных мужского пола, прошедших тестирование в одном из исправительных учреждений Сан-Паулу, оказались ВИЧ-положительными, как и 14% женщин в одном из мест заключения в том же городе. Как представляется, уровни знаний о ВИЧ среди заключенных тюрем являются высокими, но доступ к услугам по профилактике ВИЧ внутри тюрем остается неадекватным.
- В последние годы главным путем передачи ВИЧ в **Аргентине** стал незащищенный секс. В 2005 году на долю незащищенных половых связей, главным образом между мужчинами и женщинами, приходилось около 80% новых диагнозов ВИЧ. Как и в других странах региона самая высокая распространенность ВИЧ установлена среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами.

- В **Уругвае** на долю незащищенный половых отношений (в большинстве случаев гетеросексуальных) приходится, по оценкам, две трети зарегистрированных случаев ВИЧ. Уровни инфицирования среди определенных групп в столице страны, Монтевидео, также высоки: распространенность ВИЧ на уровне 22% среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, и 19% среди потребителей инъекционных наркотиков.
- В конце 2005 года большинство людей, живущих с ВИЧ, в **Парагвае** составляли мужчины. Большинство приобрели вирус через посредство либо незащищенного коммерческого секса с другими мужчинами, либо при употреблении инъекционных наркотиков.
- В **Чили** большинство ВИЧ-инфекций также происходит среди мужчин, хотя все большее число женщин становятся ВИЧ-инфицированными от своих партнеров мужского пола, которые, вероятно, были инфицированы во время незащищенного секса с другими мужчинами. В опубликованных в 2007 году исследованиях установлено, что среди работниц секс-бизнеса распространенность ВИЧ является низкой; следовательно, на небезопасные гетеросексуальные коммерческие половые отношения приходится, вероятно, лишь небольшой процент нынешнего уровня ВИЧ-инфекций.
- Секс между мужчинами продолжает представлять собой главный путь передачи ВИЧ в **Боливии, Колумбии, Эквадоре и Перу**.
- В Центральной Америке скрытые эпидемии ВИЧ среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, имеют место в **Белизе, Гватемале, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Сальвадоре**. По данным исследований, опубликованных в 2007 году, по сравнению с распространенностью ВИЧ среди взрослого населения вообще, уровни инфекции среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, были в семь раз выше в **Гондурасе**, в десять раз выше в **Гватемале и Панаме**, в 22 раза выше в **Сальвадоре** и в 38 раз выше в **Никарагуа**.
- В том же исследовании были установлены высокие уровни распространенности ВИЧ среди работниц секс-бизнеса в **Гондурасе** (10%), **Гватемале** (4%) и **Сальвадоре** (3%), и низкая распространенность на уровне 0,2% в **Никарагуа и Панаме**.
- Как представляется, резкое падение распространенности ВИЧ среди работниц секс-бизнеса в трех городах в **Гондурасе** связано со значительным повышением уровня пользования презервативами во время коммерческого секса, что позволяет предположить, что недавняя кампания по распространению презервативов и другие профилактические усилия имели успех.
- Эпидемия в **Мексике** по-прежнему в основном сконцентрирована среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, секс-работников и их клиентов и потребителей инъекционных наркотиков. По оценкам, на долю незащищенного секса между мужчинами приходится более половины (57%) зарегистрированных на сегодня ВИЧ-инфекций.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org