

Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

Ближний Восток и Северная Африка

Региональный обзор

- При определении моделей и тенденций развития эпидемий во многих странах этого региона проблемы создают неустойчивые системы эпиднадзора за ВИЧ. Информация в связи с ВИЧ о группах повышенного риска, таких как потребители инъекционных наркотиков, секс-работники и мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, остается ограниченной.
- К росту эпидемий в этом регионе могут привести два ключевых фактора: возможная передача ВИЧ от людей, употребляющих инъекционные наркотики, широкому населению и очевидное расширение незащищенных внебрачных половых связей – в некоторых странах это находит отражение в высоких уровнях других инфекций, передающихся половым путем.
- Хотя общее число зарегистрированных случаев ВИЧ в регионе остается небольшим, в нескольких странах их число растет, частично из-за расширения усилий по тестированию на ВИЧ. Одним из таких примеров является **Алжир**, где за период с 2001 по 2006 годы число зарегистрированных случаев ВИЧ удвоилось.
- Большинство случаев ВИЧ-инфекции в регионе происходит среди мужчин и в городских районах – за исключением **Судана**, где развивается более генерализованная эпидемия. В некоторых странах по мере того, как эпидемия распространяется от потребителей инъекционных наркотиков преимущественно мужского пола и клиентов секс-работников к их женам и подругам, растет доля ВИЧ-положительных женщин.
- Хотя одним из ключевых факторов в эпидемиях ВИЧ по всему региону является незащищенный коммерческий секс, потребление инъекционных наркотиков является главным путем передачи ВИЧ во многих странах, включая **Афганистан**, **Исламскую Республику Иран** и **Ливийскую Джамахирию**, и отмечается в эпидемиях в **Алжире**, **Марокко**, **Сирийской Арабской Республике** и **Тунисе**.

Страновые данные и тенденции

- Самая крупная эпидемия в регионе по-прежнему в **Судане**, причем главным фактором ее роста является небезопасный секс между мужчинами и женщинами.
- В **Алжире** и **Марокко** среди работниц секс-бизнеса была выявлена распространенность ВИЧ, намного превышающая оценочную национальную распространенность ВИЧ среди взрослого населения.
- В недавнем исследовании в **Египте** было установлено, что 6% мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, являются ВИЧ-положительными, как и 9% той же группы населения, согласно данным исследования 2006 года в штате Хартум в Судане. По данным этих исследований, почти половина мужчин в Египте (42%) и

более половины в Судане (56%) заявили, что они занимались коммерческим сексом. При этом во время платных половых отношений презервативы использовались не часто: приблизительно один из десяти мужчин в исследовании в Египте (9%) и менее половины тех, кто участвовал в исследовании в Судане, заявили, что последний раз, когда они покупали сексуальные услуги, они использовали защиту.

- По оценкам, нестерильный инструментарий для инъекционного употребления наркотиков является главным путем передачи ВИЧ в **Тунисе**, где из 186 ВИЧ-положительных пациентов, принявших участие в исследовании в одной тунисской больнице, 80% оказались потребителями инъекционных наркотиков. Возможность вспышки ВИЧ-инфекции в связи с употреблением инъекционных наркотиков существует также на **Западном Берегу** и в **Секторе Газа**, где, по оценкам, в настоящее время 40% потребителей наркотиков употребляют героин инъекционным путем.
- Самая высокая распространенность ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков существует в **Исламской Республике Иран**. Почти каждый четвертый (23%) потребитель инъекционных наркотиков мужского пола из тех, кто был протестирован на ВИЧ в одном из пунктов доверия в Тегеране, оказался ВИЧ-положительным, как и 15% из тех, кто обратился в другие наркологические центры в этом городе.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org