

## Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

### Океания

#### Региональный обзор

- Двумя странами в регионе с серьезной и растущей эпидемией ВИЧ являются **Папуа-Новая Гвинея** и **Австралия**. Хотя в других странах и территориях сообщается о намного меньшей распространенности ВИЧ, растущую обеспокоенность вызывает увеличивающееся по всему региону число инфекций, передающихся половым путем, среди основных групп населения повышенного риска.

#### Страновые данные и тенденции

- С 2002 по 2006 годы число новых ВИЧ-инфекций в **Папуа-Новой Гвинее** выросло более чем в два раза. В настоящее время около 84% всех зарегистрированных ВИЧ-инфекций произошло в сельских районах, где проживает более 80% населения страны, насчитывающего почти 6 миллионов человек.
- Главным способом передачи ВИЧ-инфекции в **Папуа-Новой Гвинее**, как представляется, являются небезопасные гетеросексуальные связи, хотя для большинства регистрируемых случаев инфекции информация о способе передачи отсутствует.
- В **Папуа-Новой Гвинее** высокая доля лиц, не получающих лечение при инфекциях, передающихся половым путем, отмечается как среди общего населения, так и в группах повышенного риска инфекции. Недавние исследования на основе общин показали, что около 40% населения имеют по крайней мере одну инфекцию, передающуюся половым путем.
- В **Папуа-Новой Гвинее** наблюдается некоторый прогресс в расширении участков добровольного консультирования и тестирования – по всей стране действует около 75 участков, - в результате чего тестирование на ВИЧ прошло большее число людей; с 2002 года это число увеличилось в три раза. Однако СПИД продолжает оставаться ведущей причиной госпитализации и смерти. В Общей больнице Порт-Морсби до 70% коек занимают пациенты с заболеваниями, связанными с ВИЧ.
- В **Австралии** эпидемия по-прежнему передается главным образом в результате сексуального поведения высокого риска среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, при этом в период с 2001 по 2005 годы это было причиной почти двух третей (64%) диагностированных новых случаев ВИЧ; похоже, что частично эта тенденция связана с увеличением числа случаев незащищенных половых отношений с нерегулярным партнером. Что касается коренного населения страны, то большему риску инфицирования ВИЧ подвергаются женщины. В одном исследовании в 2005 году было установлено, что у них вероятность ВИЧ-инфицирования была в 18 раз выше, чем у женщин, не относящихся к коренному населению, и в три раза выше, чем у мужчин, не относящихся к коренному населению.

- В **Новой Зеландии** главным фактором, способствующим передаче ВИЧ, являются небезопасные половые контакты между мужчинами, хотя число регистрируемых случаев инфицирования ВИЧ в результате небезопасных гетеросексуальных половых контактов растет.
- Ни в одной другой стране или территории в Океании со времени начала тестирования не было зарегистрировано более 300 случаев ВИЧ-инфекции. Однако факторы риска, ассоциируемые со вспышками ВИЧ-инфекции, присутствуют во многих странах; по сообщениям, в малых островных государствах **Фиджи, Кирибати и Тонга** уровень пользования презервативами во всех группах населения находится на чрезвычайно низком уровне.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org)