

## Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

### Африка к югу от Сахары

#### Региональный обзор

- Африка к югу от Сахары продолжает оставаться регионом, наиболее сильно затронутым эпидемией СПИДа, при этом здесь проживает более двух третей (68%) всех людей, инфицированных ВИЧ.
- Непропорционально сильно затронуты женщины, доля которых составляет 61% людей, живущих с ВИЧ в регионе.
- На большей части Африки к югу от Сахары национальные показатели распространенности ВИЧ либо стабилизировались, либо демонстрируют признаки снижения. В **Кот-д'Ивуаре, Кении и Зимбабве** – везде в развитие ранее наметившихся тенденций отмечено снижение национальной распространенности.
- Данные о тенденциях изменения сексуального поведения среди молодежи в некоторых странах (**Камерун, Кения, Зимбабве, Малави, Руанда, Того, Объединенная Республика Танзания и Замбия**) вселяют надежду и позволяют предположить, что усилия по профилактике ВИЧ возымели действие.
- По оценкам, от 50 до 80% туберкулезных больных на **юге Африки** являются также ВИЧ-положительными, что подчеркивает необходимость принятия неотложных мер против коинфекции ВИЧ/ТБ в регионе.

#### Страновые данные и тенденции

- В 2007 году почти треть (32%) всех новых ВИЧ-инфекций и связанных со СПИДом смертей в мире приходилось на долю **южной части Африки**.
- Данные нескольких исследований обнаруживают, что в **Зимбабве** в последние годы эпидемия уменьшается, при этом произошло значительное падение распространенности ВИЧ среди беременных женщин, с 26% в 2002 году до 18% в 2006 году. Среди молодых беременных женщин (в возрасте 15–24 лет) за тот же период распространенность упала с 21 до 14%. Эти цифры согласуются с самым последним обследованием населения в связи с ВИЧ (2005-2006 гг.), где национальная распространенность ВИЧ среди взрослых (в возрасте 15–49 лет) оценивается на уровне 18%. Снижение числа ВИЧ-инфекций частично объясняется сообщениями о более безопасном сексуальном поведении, при этом есть данные о росте числа людей, избегающих половых отношений с нерегулярными партнерами, и об уменьшении числа взрослых мужчин, оплачивающих сексуальные услуги.
- **Южная Африка**, насчитывающая около 5,5 миллиона людей, живущих с ВИЧ, является страной с самым большим числом инфекций в мире. В соответствии с такими же тенденциями в других странах этого региона молодые женщины в Южной Африке сталкиваются с большим риском инфицирования, чем мужчины: в возрастной группе 15–24 лет на их долю приходится около 90% новых ВИЧ-инфекций.

Объединим мир против **СПИДа**

- В **Свазиленде** национальная распространенность ВИЧ среди взрослых составляет 26% и является самой высокой в мире.
- В **Ботсване** в последние года уровни ВИЧ-инфекции среди беременных женщин снизились с 36% в 2001 году до 32% в 2006 году, что позволяет предположить, что эпидемия могла достигнуть своего пика и, возможно, снижается.
- Самые последние данные, поступающие из **Анголы**, указывают на то, что распространенность ВИЧ среди беременных женщин в 2004 и 2005 годах была одинаковой, что говорит о возможной стабилизации эпидемии.
- На большей части Восточной Африки распространенность ВИЧ среди взрослого населения либо стабильна, либо слегка снижается. Последняя тенденция наиболее заметна в **Кении**, которая переживает медленное, но последовательное уменьшение числа ВИЧ-инфекций на фоне данных об изменении поведения, особенно среди молодых неженатых взрослых.
- Неоднородные данные из **Уганды** указывают на срочную необходимость возродить и адаптировать тот вид профилактических усилий, которые в 1990-х годах помогли взять эпидемию в стране под контроль. Несмотря на общую тенденцию сохранения распространенности ВИЧ на том же уровне, рост численности населения в стране, в сочетании с данными о росте числа ВИЧ-инфекций в некоторых областях, может указывать на повторное возникновение эпидемии; при темпах рождаемости около 7% стабильный показатель ВИЧ-инфицирования означает, что ежегодно число людей, заражающихся ВИЧ, будет расти.
- В **Руанде** одним из недавних улучшений в действиях в ответ на ВИЧ является расширение услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, которые сейчас можно получить в более чем половине медицинских учреждений страны.
- Эпидемии в Западной Африке в целом стабильны, за исключением **Буркина-Фасо** (только в городских районах), **Кот-д'Ивуара** и **Мали**, где распространенность ВИЧ снижается.
- И в **Буркина-Фасо**, и в **Кот-д'Ивуаре** есть данные о таких изменениях в поведении, которые могут ограничить распространение ВИЧ. Уровень пользования презервативами среди женщин во время половых отношений с нерегулярным партнером существенно вырос - с 39 до 53% в период с 1998–1999 годов до 2003 года в первой из них и с 21 до 34% в период с 1998 по 2005 годы во второй.
- Исследования из **Бенина** показывают, что увеличилась вероятность того, что мужчины и женщины, вступающие в половые отношения с нерегулярным партнером, будут при этом пользоваться презервативом. В период с 1996 по 2006 годы показатель пользования презервативами во время половых отношений повышенного риска увеличился с 9 до 25% для женщин и с 22 до 40% для мужчин.
- Национальная распространенность ВИЧ среди взрослых в **Центральноафриканской Республике** является одной из самых высоких во всей Западной и Центральной Африке и в национальном обследовании 2006 года оценивается на уровне 6,2%.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org