



ONUSIDA
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR
UNICEF
FMA
UNFPA
ONUDD
OIT
UNESCO
OMS
BANCO MUNDIAL



**Organización
Mundial de la Salud**

Hoja de datos

Fuente: Situación de la epidemia de sida 2007 – Resumen regional

Europa oriental y Asia central

Resumen regional

- Las epidemias de VIH en Europa oriental y Asia central se concentran principalmente entre personas que se inyectan drogas, profesionales del sexo, sus respectivas parejas sexuales y, en menor medida, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. De los nuevos casos de VIH notificados en 2006, sobre los cuales había información sobre el modo de transmisión, el 62% se atribuyó al consumo de drogas inyectables y el 37% a las relaciones sexuales sin protección entre hombres y mujeres. Menos del 1% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH en toda la región se produjeron entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aunque se desconoce el grado real en que las prácticas sexuales entre varones contribuyen a la epidemia de la región.
- Casi el 90% de los nuevos diagnósticos comunicados de VIH en Europa oriental y Asia central en 2006 tuvieron lugar en la **Federación de Rusia y Ucrania**.
- En cuanto al resto, las cifras anuales de nuevos casos de diagnóstico de VIH también están aumentando en **Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán** (que en este momento padece la mayor epidemia de Asia central).
- Alrededor del 40% de los nuevos casos de VIH registrados en 2006 en Europa oriental y Asia central correspondió a mujeres. En la **Federación de Rusia y Ucrania**, se cree que cerca de dos tercios del creciente número de casos de VIH entre mujeres se atribuyen directa o indirectamente (mujeres infectadas por una pareja sexual que se inyecta drogas) al consumo de drogas inyectables.
- Los esfuerzos por introducir y, en algunos casos, ampliar programas de reducción del daño en esta región continúan avanzando. En la **Federación de Rusia**, más de 50 proyectos de intercambio de agujas y jeringas funcionaban en 2007 y, en **Kazajstán**, opera desde 2005 un programa nacional de más de 120 centros de reducción del daño. Algunos países, entre ellos, **Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, la República de Moldavia y Uzbekistán**, han puesto en marcha proyectos piloto para el tratamiento con sustitutos de los opioides,

Datos y tendencias por países

- La epidemia de VIH en la **Federación de Rusia** sigue creciendo, aunque no tan rápidamente como a fines de la década de los noventa, y se concentra en gran parte en los centros urbanos e industriales del país. Casi el 60% de los casos de VIH comunicados hasta la fecha se han producido en 10 ciudades y regiones importantes, entre ellas, las ciudades de San Petersburgo y Moscú.
- En la **Federación de Rusia**, el consumo de drogas inyectables continúa siendo el modo más importante de transmisión del VIH. De los nuevos casos de VIH registrados en

Uniendo el mundo contra el **SIDA**

2006, para aquellos que se conocía el modo de transmisión, dos tercios (66%) se debían al consumo de drogas inyectables; y alrededor de un tercio (32%), al coito heterosexual sin protección. Las mujeres conformaron alrededor del 44% de los nuevos casos de VIH registrados en 2006.

- En 2006, menos del 1% de los nuevos casos de VIH registrados en la **Federación de Rusia** —en los que se conocía el modo de transmisión— se atribuyó a las relaciones sexuales peligrosas entre varones. Esta cifra posiblemente subestima el grado en que el VIH se ha transmitido entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, dado que investigaciones recientes han revelado la existencia de una significativa adopción de riesgos que puede aumentar las probabilidades de contraer el VIH, como el uso poco frecuente de preservativos y el consumo de drogas inyectables.
- **Ucrania** registra la prevalencia del VIH en adultos más alta de cualquier país de Europa o Asia central; los diagnósticos de VIH anuales ascendieron a más del doble desde 2001. El consumo de drogas inyectables sigue siendo el principal modo de transmisión del VIH en **Ucrania**: el número de personas que se inyectan drogas con diagnóstico reciente de VIH aumentó de 3 964 en 2001 a 7 127 en 2006. En la primera mitad de 2007, se notificaron 3 639 nuevas infecciones por el VIH entre usuarios de drogas inyectables, lo que representa el mayor aumento entre cualquier población de Ucrania.
- **Ucrania** ha tomado importantes medidas para limitar la transmisión del VIH de madres a hijos. En 2006, se les realizó pruebas del VIH al 95% de todas las embarazadas, y el 93% de las mujeres VIH-positivas que dieron a luz habían estado recibiendo profilaxis antirretrovírica durante el embarazo y el parto para prevenir la transmisión del VIH.
- La epidemia de VIH más extensa de Asia central se registra en **Uzbekistán**, y es probable que continúe en aumento, dado los informes de alto nivel de consumo de drogas inyectables y de relaciones sexuales con parejas no habituales. El número de nuevos diagnósticos comunicados de VIH se elevó exponencialmente entre 1999 y 2003: de 28 a 1 836. Desde entonces, el número de nuevas infecciones por el VIH comunicadas ha aumentado a un ritmo más lento, ya que en 2006 llegó a 2 205.
- En **Kazajstán**, las personas que se inyectan drogas representan dos tercios de las nuevas infecciones por el VIH comunicadas en 2006. Las epidemias de VIH en **Kirguistán** y **Tayikistán** también se concentran mayormente en el consumo de drogas inyectables. Sólo dos casos de VIH se han notificado de manera oficial en **Turkmenistán**, y poco se sabe sobre el potencial para la transmisión del virus en ese país.
- La epidemia de VIH en **Belarús** parece haberse estabilizado, ya que el número anual de nuevos diagnósticos de VIH comunicados varió sólo ligeramente desde 2003 (entre 713 y 778). En su mayoría, las infecciones por el VIH se comunican en zonas urbanas y sus alrededores, como la capital Minsk y, en gran medida, entre personas que se inyectan drogas. También es cada vez mayor el número de mujeres afectadas por el VIH. En las pruebas de VIH realizadas a gran escala en 2006, el 80% de los nuevos casos de VIH en mujeres se atribuyeron a las relaciones sexuales peligrosas, lo que representa un aumento en comparación con el 56% registrado en 2003.
- Desde 2003, los nuevos casos de VIH comunicados en la **República de Moldavia** han ascendido a más del doble, lo que elevó la cifra a 621 en 2006. Casi el 60% de estos casos se atribuyeron a relaciones sexuales sin protección.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org