

Hoja de datos

Fuente: Situación de la epidemia de sida 2007 – Resumen regional

América Latina

Resumen regional

- Las epidemias de VIH en América Latina por lo general permanecen estables, pero la transmisión del virus continúa produciéndose entre poblaciones en mayor riesgo de exposición. Entre ellas se incluyen los profesionales del sexo y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ambos grupos que aún no disponen de acceso adecuado a los servicios de prevención del VIH, tratamiento, atención y apoyo.
- Las iniciativas de vigilancia del VIH deben mejorarse en muchos países de esta región para posibilitar una mejor comprensión de las tendencias actuales de la epidemia.

Datos y tendencias por países

- Si bien en **Brasil** reside alrededor de un tercio de todas las personas que viven con el VIH en América Latina, la objetivo simultáneo centrado en asegurar el acceso tanto a los servicios de prevención del VIH como al tratamiento ha contribuido a mantener estable la epidemia. Entretanto, el acceso generalizado al tratamiento antirretrovírico redujo a la mitad las tasas de mortalidad por sida entre 1996 y 2002.
- Cada vez más mujeres en **Brasil** contraen la infección por el VIH, en gran parte a través de sus parejas sexuales masculinas que podrían haberse infectado durante relaciones sexuales sin protección con otro hombre u otra mujer o por el uso de equipos de inyección no estériles.
- Se estima que las relaciones sexuales sin protección entre varones representan cerca de la mitad de las infecciones por el VIH que se transmiten por vía sexual en **Brasil**.
- En este país, se ha encontrado una alta prevalencia entre reclusos. Casi el 6% de los reclusos varones de una penitenciaría de San Pablo a los que se les realizó la prueba del VIH resultaron VIH-positivos, al igual que el 14% de las mujeres de un centro de detención de la misma ciudad. Los niveles del conocimiento sobre el VIH entre reclusos parecen ser altos, pero el acceso a los servicios de prevención dentro de las prisiones sigue siendo inadecuado.
- En los últimos años, las relaciones sexuales sin protección en **Argentina** se han convertido en la principal vía de transmisión del VIH. Alrededor del 80% de los nuevos diagnósticos de VIH en 2005 se atribuyeron al coito sin protección, principalmente entre varones y mujeres. Al igual que en otros países de la región, se ha observado que la mayor prevalencia del VIH se registra entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
- En **Uruguay**, las relaciones sexuales (en su mayoría heterosexuales) sin protección son responsables de aproximadamente dos tercios de los casos de VIH notificados. Los niveles de infección también son elevados entre determinados grupos de la capital,

Montevideo: la prevalencia del VIH es del 22% entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y del 19% entre usuarios de drogas inyectables.

- La mayoría de las personas que vivían con el VIH en **Paraguay** a fines de 2005 eran varones. En su mayor parte, contrajeron el virus a través de relaciones sexuales remuneradas sin protección con otros varones o por la práctica de inyección de drogas.
- En **Chile**, la mayoría de las infecciones por el VIH también se producen en varones, aunque cada vez más mujeres contraen el VIH de sus parejas masculinas, que probablemente se infectaron durante relaciones sexuales sin protección con otros varones. Según estudios publicados en 2007, la prevalencia del VIH es baja entre profesionales femeninas del sexo; por lo tanto, las relaciones heterosexuales remuneradas peligrosas probablemente representen apenas un pequeño porcentaje de las actuales infecciones por el VIH.
- Las relaciones sexuales entre varones sigue siendo la principal vía de transmisión del VIH en **Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú**.
- En América Central, ya han comenzado epidemias ocultas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en **Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá**. En comparación con la prevalencia del VIH en la población adulta general, una investigación publicada en 2007 indican que los niveles de infección entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres eran siete veces mayores en Honduras, 10 veces mayores en Guatemala y Panamá, 22 veces mayores en El Salvador y 38 veces mayores en Nicaragua.
- El mismo estudio halló elevados niveles de prevalencia del VIH entre profesionales femeninas del sexo en **Honduras** (10%), **Guatemala** (4%) y **El Salvador** (3%), y una baja prevalencia (0,2%) en **Nicaragua y Panamá**.
- En tres ciudades de **Honduras**, el marcado descenso observado en la prevalencia del VIH entre profesionales femeninas del sexo parece estar vinculado con incrementos significativos en el uso de preservativos durante el comercio sexual, lo que sugiere que la promoción del uso de preservativos y otras iniciativas de prevención han dado resultados.
- La epidemia de **México** sigue concentrada principalmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo y sus clientes y usuarios de drogas inyectables. Según las estimaciones, las relaciones sexuales sin protección entre varones dan cuenta de más de la mitad (57%) de las infecciones por el VIH registradas hasta la fecha.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org