

Hoja de datos

Fuente: Situación de la epidemia de sida 2007 – Resumen regional

Oriente Medio y África del Norte

Resumen regional

- Los sistemas desiguales de vigilancia del VIH presentan dificultades a la hora de determinar los patrones y las tendencias de la epidemia en muchos países de esta región. La información relacionada con el VIH en grupos de mayor riesgo, como las personas que se inyectan drogas, los profesionales del sexo y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, sigue siendo limitada.
- Dos factores clave podrían incrementar la epidemia en la región: la posible transmisión del VIH de usuarios de drogas inyectables a la población en general y el aparente aumento de las relaciones sexuales extramatrimoniales sin protección, lo que se refleja en los altos niveles de otras infecciones de transmisión sexual que se registran en algunos países.
- Si bien los números generales de casos comunicados de VIH en la región siguen siendo bajos, en varios países han aumentado, en parte debido a la ampliación de las iniciativas de promoción de las pruebas del VIH. Un ejemplo es Argelia, donde los casos comunicados de VIH se duplicaron entre 2001 y 2006.
- La mayoría de las infecciones por el VIH en la región se producen en varones y en zonas urbanas, excepto en **Sudán**, donde ya ha comenzado la generalización de la epidemia. En algunos países, la proporción de mujeres VIH-positivas está en aumento, a medida que la epidemia se propaga desde principalmente usuarios masculinos de drogas inyectables y clientes de profesionales del sexo hacia sus esposas y novias.
- Si bien las relaciones sexuales remuneradas sin protección constituyen un factor clave en la epidemia del VIH en toda la región, el consumo de drogas inyectables es la principal vía de transmisión del virus en muchos países, como **Afganistán**, la **República Islámica de Irán** y la **Jamahiriya Árabe Libia** y contribuye a las epidemias de **Argelia**, **Marruecos** y la **República Árabe Siria**.

Datos y tendencias por países

- **Sudán** sigue teniendo la epidemia más extendida de esta región, y el principal factor impulsor son las relaciones sexuales peligrosas entre varones.
- En **Argelia** y **Marruecos**, la prevalencia del VIH bastante por encima de la prevalencia nacional estimada del VIH en adultos se ha registrado entre profesionales femeninas del sexo.
- Un estudio reciente realizado en **Egipto** halló que el 6% de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres era VIH-positivo, al igual que el 9% del mismo grupo, según un estudio llevado a cabo en el estado de Khartoum, **Sudán**. Casi la mitad (42%) de los varones egipcios y más de la mitad (56%) de los varones sudaneses de esos

estudios comunicaron haber mantenido relaciones sexuales remuneradas. Aún así, el uso de preservativos durante las relaciones sexuales remuneradas fue poco frecuente: alrededor de uno de cada 10 (9%) de varones del estudio egipcio y menos de la mitad de los del estudio sudanés comunicaron haber utilizado protección la última vez que pagaron por sexo.

- Se estima que los equipos no estériles de inyección de drogas constituyen la principal vía de transmisión en **Túnez**, donde más del 80% de los 186 pacientes VIH-positivos inscriptos en un estudio realizado en un hospital tunecino se inyectaban drogas. También existe el potencial de que ocurran brotes de infección por el VIH relacionada con la inyección de drogas en la **Ribera Occidental** y la **Franja de Gaza**, donde se estima que el 40% de consumidores de heroína ahora se inyectan la droga.
- La **República Islámica de Irán** tiene la prevalencia del VIH más elevada entre usuarios de drogas inyectables de la región. Casi uno de cada cuatro (23%) usuarios masculinos de drogas inyectables en un centro de acogida y consulta de Teherán eran VIH-positivos, al igual que el 15% de aquellos que acudían a centros de tratamiento para toxicómanos de la ciudad.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org