



**ONUSIDA**  
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR  
UNICEF  
FMA  
PNUJ  
UNFPA  
ONUDD  
OIT  
UNESCO  
OMS  
BANCO MUNDIAL



**Organización  
Mundial de la Salud**

## Hoja de datos

Fuente: Situación de la epidemia de sida 2007 – Resumen regional

### **América del Norte, Europa occidental y central**

#### **Resumen regional**

- En estas regiones, el número total de personas que viven con el VIH continúa en aumento —debido en gran parte a los efectos de la terapia antirretrovírica sobre la supervivencia—, con un número relativamente estable de nuevas infecciones anuales en América del Norte y un incremento en el número de nuevos diagnósticos de VIH en Europa occidental desde 2002.
- En América del Norte, las prácticas sexuales entre hombres representaron la mayor proporción de nuevos diagnósticos de VIH en 2005: 53% en los **Estados Unidos de América** y 45% en **Canadá**.
- La epidemia de VIH sigue afectando desproporcionadamente a los afroamericanos en los **Estados Unidos** y a las personas aborígenes en **Canadá**.
- En 2006, las relaciones heterosexuales conformaron la proporción más grande (42%) de diagnósticos de VIH en Europa occidental. Menos de un tercio (29%) se atribuyeron a prácticas sexuales peligrosas entre varones, mientras que una proporción en disminución de diagnósticos (6%) se comunicó en usuarios de drogas inyectables. En su mayoría, los casos de VIH transmitido por vía heterosexual se originaron en países del África subsahariana con alta prevalencia y, dentro de ese grupo, más del 50% de los nuevos diagnósticos de VIH corresponden a mujeres.
- El acceso generalizado al tratamiento antirretrovírico eficaz ha contribuido a mantener relativamente bajo el número de fallecimientos relacionados con el sida en estas regiones.

#### **Datos y tendencias por países**

- En los **Estados Unidos**, las relaciones sexuales sin protección entre varones sigue siendo la vía más frecuente de transmisión del VIH. El número anual de nuevos diagnósticos de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (incluidos aquellos que también eran usuarios de drogas inyectables) aumentó de 17 699 en 2001 a 19 620 en 2005.
- Por el contrario, el 80% de mujeres adultas y adolescentes a quienes se les diagnosticó VIH el mismo año lo contrajeron durante prácticas sexuales sin protección, generalmente con varones que se habían infectado a través de equipos de inyección no estériles, relaciones sexuales remuneradas o con otros hombres, lo que representa un aumento del 75% registrado en 2001.
- Casi la mitad (48%) de los nuevos diagnósticos de VIH se produjeron entre afroamericanos, y el 18% entre hispanos (quienes representan el 13% y el 14% de la población de los **Estados Unidos**, respectivamente).

Uniendo el mundo contra el **SIDA**

- En 2007, en los **Estados Unidos** se obtuvo más información sobre los efectos que produce un mayor acceso a tratamiento antirretrovírico eficaz. Según un estudio realizado en seis estados, las hospitalizaciones de personas con VIH descendió un 44% entre 2000 y 2004, y la edad promedio de personas con VIH hospitalizadas aumentó.
- A fines de 2005, se estimaba que había 58 000 personas que vivían con el VIH en **Canadá**. Resulta preocupante la estimación de que al menos una de cada cuatro personas que viven con el VIH en el país no saben que están infectadas.
- Si bien las personas aborígenes en **Canadá** constituyen apenas un poco más del 3% de la población total, se estima que representan un 7,5% de las personas que viven con el VIH, así como el 9% de las nuevas infecciones por el VIH producidas en 2005.
- La epidemia de VIH en el **Reino Unido** sigue siendo de gran magnitud: entre 2001 y 2006 se duplicó el número de nuevos diagnósticos de infección por el VIH; y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres corren el mayor riesgo de contraer VIH dentro del país.
- Entre 2002 y 2008, el número de diagnósticos de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres casi se duplicó en **Alemania** (donde se registró un aumento del 87%), se incrementó en tres cuartos (un 77%) en **Suiza**, dos tercios (un 67%) en **Bélgica** y un tercio (un 31%) en el **Reino Unido**.
- Los diagnósticos de VIH en **Alemania** aumentaron casi en un 50% entre 2002 y 2006; y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres conformaron cerca del 60% de las 56 000 personas que se estima que vivían con el VIH a fines de 2006. Ese mismo año, las prácticas sexuales peligrosas entre varones representaron el 70% de los diagnósticos de VIH.
- Los números de nuevos diagnósticos de VIH en usuarios de drogas inyectables descendieron en varios países europeos entre 2002 y 2006, principalmente en **Dinamarca** (en un 72%), **Italia** (en un 42% entre 2002 y 2005), los **Países Bajos** (en un 91%), **Portugal** (en un 38%), **España** (en un 38% entre 2003 y 2005) y **Suiza** (en un 26%). Varios estudios realizados en los **Países Bajos** y **España** sugieren que los programas de reducción del daño disminuyen el consumo de drogas inyectables y el uso de equipos no estériles.
- Las relaciones sexuales sin protección entre hombres y mujeres constituyen el principal modo de infección en muchos países de Europa central, entre ellos, **Albania**, **Bosnia y Herzegovina**, **Bulgaria**, **Rumania** y **Turquía**. Las relaciones sexuales peligrosas entre varones predominan en **Croacia**, la **República Checa**, **Hungría** y **Eslovenia**.
- Las infecciones por el VIH en **Estonia** han descendido de un punto máximo de 1 474 en 2001 a 668 en 2006. Pese a este brusco descenso, el país sigue teniendo la tasa más alta de nuevos diagnósticos de VIH comunicados y, según se estima, la prevalencia nacional más alta de VIH en adultos (1,3%) de toda Europa.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org