



**ONUSIDA**  
PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA

HCR  
UNICEF  
PAM  
PNUD  
UNFPA  
ONUDC  
OIT  
UNESCO  
OMS  
BANQUE MONDIALE



**Organisation  
mondiale de la Santé**

## Aide-mémoire

Source: Le point sur l'épidémie de sida, 2007—résumés par région

### Amérique du Nord, Europe occidentale et centrale

#### Aperçu régional

- Dans ces régions, le nombre total des personnes vivant avec le VIH continue de s'accroître, notamment en raison de l'allongement de la survie dû à la thérapie antirétrovirale, à un nombre relativement stable de nouvelles infections chaque année en Amérique du Nord et à une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics de VIH en Europe occidentale depuis 2002.
- En Amérique du Nord, les rapports sexuels non protégés entre hommes ont représenté la plus forte proportion des nouveaux diagnostics de VIH en 2005 : 53% aux **Etats-Unis d'Amérique** et 45% au **Canada**.
- Les épidémies de VIH continuent de frapper de manière disproportionnée les Africains-Américains aux **Etats-Unis** et les populations autochtones au **Canada**.
- Les rapports hétérosexuels ont constitué la plus grande proportion (42%) des nouveaux diagnostics de VIH en Europe occidentale en 2006. Moins d'un tiers (29%) étaient imputables aux rapports sexuels non protégés entre hommes, alors qu'une proportion en baisse des diagnostics (6%) a été signalée parmi les consommateurs de drogues injectables. La majorité des cas de VIH transmis par la voie hétérosexuelle trouvent leur origine dans les pays à forte prévalence d'Afrique subsaharienne ; dans ce groupe, plus de 50% des nouvelles infections à VIH sont diagnostiquées chez des femmes.
- L'accès généralisé à des traitements antirétroviraux efficaces a contribué à maintenir assez bas le nombre des décès liés au sida dans ces régions.

#### Données et tendances dans les pays

- Les rapports sexuels non protégés entre hommes restent le mode le plus courant de transmission du VIH aux **Etats-Unis**. Le nombre annuel des nouveaux diagnostics de VIH chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (y compris ceux qui consomment également des drogues injectables) a passé de 17 699 en 2001 à 19 620 en 2005.
- Par contraste, 80% (par rapport aux 75% de 2001) des femmes adultes et adolescentes dont l'infection à VIH a été diagnostiquée en 2005 avaient contracté l'infection au cours de rapports sexuels non protégés, souvent avec des partenaires de sexe masculin qui avaient été infectés par du matériel d'injection non stérile, des rapports sexuels tarifés ou des rapports sexuels avec d'autres hommes.
- Près de la moitié (48%) des nouveaux diagnostics de VIH ont été posés chez des Africains-Américains et 18% chez des Hispaniques (qui constituent respectivement 13% et 14% de la population des **Etats-Unis**).
- En 2007, de nouvelles informations ont été publiées concernant les effets d'un accès accru à des traitements antirétroviraux efficaces aux **Etats-Unis**. Selon une étude

conduite dans six états, les admissions hospitalières impliquant des personnes vivant avec le VIH ont baissé de 44% entre 2000 et 2004 et l'âge moyen des personnes vivant avec le VIH admises à l'hôpital a augmenté.

- A fin 2005, on estimait à 58 000 le nombre des personnes vivant avec le VIH au **Canada**. Il est préoccupant de noter qu'une personne sur quatre au moins vivant avec le VIH dans le pays n'est pas consciente d'être infectée.
- Si les personnes autochtones au **Canada** représentent un peu plus de 3% de la population totale, on estime qu'elles constituent 7,5% des personnes vivant avec le VIH, et 9% des nouvelles infections en 2005.
- Le **Royaume-Uni** connaît toujours une importante épidémie de VIH et le nombre annuel d'infections à VIH nouvellement diagnostiquées a plus que doublé entre 2001 et 2005 et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes restent le groupe de la population le plus exposé au risque d'infection par le VIH dans le pays.
- Les nouveaux diagnostics de VIH parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes en **Allemagne** ont presque doublé entre 2002 et 2006 (ils ont augmenté de 87%) ; ils ont augmenté de trois quarts (77%) en **Suisse**, de deux tiers (67%) en **Belgique**, et d'un tiers (31%) au **Royaume-Uni**.
- En **Allemagne**, les nouveaux diagnostics de VIH ont augmenté de près de 50% entre 2002 et 2006 et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes constituaient environ 60% des quelque 56 000 personnes vivant avec le VIH à fin 2006. Les rapports sexuels non protégés entre hommes représentaient 70% des diagnostics de VIH en 2006.
- Le nombre des nouveaux diagnostics de VIH chez les consommateurs de drogues injectables a chuté dans plusieurs pays d'Europe entre 2002 et 2006, en particulier au **Danemark** (de 72%), en **Espagne** (de 38% entre 2003 et 2005), en **Italie** (de 42% entre 2002 et 2005), aux **Pays-Bas** (de 91%), au **Portugal** (de 38%), et en **Suisse** (de 26%). Des études en **Espagne** et aux **Pays-Bas** montrent que les programmes de réduction des risques sont associés à une baisse de la consommation de drogues injectables et de l'utilisation de matériel non stérile.
- Dans de nombreux pays d'Europe centrale, les rapports sexuels non protégés entre hommes et femmes sont la principale voie de transmission de l'infection, y compris en **Albanie**, en **Bosnie-Herzégovine**, en **Bulgarie**, en **Roumanie** et en **Turquie**. Les rapports sexuels non protégés entre hommes prédominent en **Croatie**, en **Hongrie**, en **République tchèque** et en **Slovénie**.
- En **Estonie**, les infections à VIH nouvellement diagnostiquées ont baissé d'un maximum de 1474 en 2001 à 668 en 2006. Malgré cette forte baisse, le pays garde de loin le taux le plus élevé de nouveaux diagnostics de VIH notifiés et la prévalence du VIH estimée chez les adultes la plus élevée de toute l'Europe (1,3%).

Contact:

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org