



**ONUSIDA**  
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA

ACNUR  
UNICEF  
FMA  
PNUJ  
UNFPA  
ONUDD  
OIT  
UNESCO  
OMS  
BANCO MUNDIAL



**Organización  
Mundial de la Salud**

## Hoja de datos

Fuente: Situación de la epidemia de sida 2007 – Resumen regional

### África subsahariana

#### Resumen regional

- África subsahariana sigue siendo la región más afectada por la epidemia de sida: más de dos tercios (68%) de todas las personas infectadas por el VIH viven en esta región.
- La epidemia afecta desproporcionadamente a las mujeres, que representan el 61% de las personas que viven con el VIH en la región.
- En la mayor parte de África subsahariana, la prevalencia nacional del VIH se ha estabilizado o muestra signos de disminuir. En **Côte d'Ivoire**, **Kenya** y **Zimbabwe**, se registraron descensos en la prevalencia nacional, en concordancia con las tendencias anteriores.
- En algunos países (**Camerún**, **Kenya**, **Zimbabwe**, **Malawi**, **Rwanda**, **Togo**, **República Unida de Tanzania** y **Zambia**), los datos sobre las tendencias de comportamiento sexual entre jóvenes son alentadores y sugieren que las iniciativas de prevención del VIH están dando resultado.
- Se estima que entre el 50% y el 80% de los pacientes con tuberculosis de **África meridional** también son VIH-positivos, lo que pone en evidencia la urgencia de abordar la coinfección VIH/TB en la región.

#### Datos y tendencias por países

- En 2007, **África meridional** representó prácticamente un tercio (32%) de todas las nuevas infecciones por el VIH y defunciones por el sida a nivel mundial.
- Varios estudios revelan que la epidemia de **Zimbabwe** ha disminuido en los últimos años, y se ha registrado un descenso significativo en la prevalencia del VIH en embarazadas, de un 26% en 2002 a un 18% en 2006. Entre embarazadas jóvenes (15–24 años), la prevalencia disminuyó del 21% al 14% en el mismo periodo. Estas cifras se corresponden con la encuesta poblacional más reciente sobre VIH (2005-2006) que estimó en 18% la prevalencia nacional del VIH en adultos (15–49 años). La disminución en la incidencia del VIH se vincula, en cierta medida, con notificaciones de comportamiento sexual más seguro, respaldadas por pruebas de un mayor número de personas que evitan las relaciones sexuales con parejas no habituales y de un menor número de varones adultos que pagan para tener relaciones sexuales.
- **Sudáfrica**, con cerca de 5,5 millones de personas que viven con el VIH, es el país con el mayor número de infecciones del mundo. En coincidencia con tendencias similares de otros países de la región, las mujeres jóvenes de Sudáfrica afrontan riesgos más altos de contraer la infección que los varones: las mujeres entre 15 y 24 años conforman alrededor del 90% de las nuevas infecciones por el VIH.

Uniendo el mundo contra el **SIDA**

- En **Swazilandia**, la prevalencia nacional del VIH en adultos (26%) es la más elevada del mundo.
- En **Botswana**, una disminución en los niveles del VIH entre embarazadas en los últimos años (del 36% en 2001 al 32% en 2006) da a entender que la epidemia posiblemente haya alcanzado su punto máximo y que podría estar en descenso.
- Los últimos datos provenientes de **Angola** indican que la prevalencia del VIH entre embarazadas era similar en 2004 y 2005, lo que sugiere una posible estabilización de la epidemia.
- En la mayor parte de África oriental, la prevalencia del VIH en adultos es estable o bien presenta una ligera disminución. La última tendencia es más notoria en **Kenya**, que experimenta un declive lento pero firme en las infecciones por el VIH con indicios de un cambio de comportamientos, especialmente entre adultos jóvenes solteros.
- Datos combinados provenientes de **Uganda** señalan una necesidad urgente de reavivar y adaptar el tipo de iniciativas de prevención que ayudaron a controlar la epidemia del país en la década de los 90. Pese a una tendencia general a la estabilización de la prevalencia del VIH, la creciente población del país, en combinación con indicios de aumentos de la infección por el VIH en algunas zonas, podría sugerir un resurgimiento de la epidemia; con una tasa de fertilidad cercana al 7%, una tasa de incidencia del VIH estable significa que cada año un mayor número de personas contraen el VIH.
- Entre las recientes mejoras producidas en la respuesta al VIH en **Rwanda**, se encuentra la ampliación de los servicios para prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos, que ahora se ofrecen en más de la mitad de los centros de salud del país.
- Las epidemias en África occidental por lo general son estables, a excepción de Burkina Faso (sólo zonas urbanas), **Côte d'Ivoire** y **Mali**, donde la prevalencia del VIH está en descenso.
- Tanto en **Burkina Faso** como en **Côte d'Ivoire**, se observan indicios de un cambio hacia comportamientos que pueden limitar la propagación del VIH. El uso de preservativos durante las relaciones sexuales con una pareja no habitual aumentó considerablemente para las mujeres —de 39% a 53% entre 1998–1999 y 2003 en el primero, y de 21% a 34% entre 1998 y 2005 en el último.
- Algunos estudios de **Benin** revelan que las mujeres y varones que mantenían relaciones sexuales con una pareja no habitual tenían más probabilidad de usar preservativos durante el acto sexual. El uso de preservativos en prácticas sexuales de mayor riesgo se elevó de un 9% a un 25% en el caso de las mujeres y de un 22% a un 40% para los varones entre 1996 y 2006.
- En la **República Centroafricana**, la prevalencia nacional del VIH en adultos se encuentra entre las más altas de África occidental y central y, según una encuesta nacional realizada en 2006, se estima que es de un 6,2%.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org