

Глобальная эпидемия СПИДа

- С момента начала эпидемии ВИЧ **заразились почти 60 миллионов человек и 25 миллионов человек умерли** от заболеваний, связанных с ВИЧ,
- В 2008 году **число людей, живущих с ВИЧ**, составляло около **33,4 [31,1–35,8] миллиона человек**, число **новых инфекций** около **2,7 [2,4–3,0] миллиона** и **2 [1,7–2,4] миллиона человек умерли** от заболеваний, связанных со СПИДом.
- В 2008 году примерно **430 000 [240 000–610 000] детей родились с ВИЧ**, в результате общее число детей моложе 15 лет, живущих с ВИЧ, составило **2,1 [1,2–2,9] миллиона человек**,
- Во всем мире на **молодых людей** приходится около **40%** всех новых ВИЧ-инфекций, регистрируемых среди взрослых (старше 15 лет).
- **Африка к югу от Сахары** остается наиболее затронутым регионом: здесь **проживает 67% всех людей, живущих с ВИЧ**, и зарегистрирован **91% всех новых случаев инфекции среди детей**.
- В результате эпидемии **более 14 миллионов детей** в Африке к югу от Сахары стали сиротами.

Региональные статистические данные

	Число людей, живущих с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций в 2008 году	Число смертей в связи со СПИДом в 2008 году	Распространенность ВИЧ среди взрослых (%)
Африка к югу от Сахары	22,4 миллиона [20,8–24,1] миллиона	1,9 миллиона [1,6–2,2 миллиона]	1,4 миллиона [1,1–1,7 миллиона]	5,2% [4,9%–5,4%]
Южная и Юго-Восточная Азия	3,8 миллиона [3,4–4,3 миллиона]	280 000 [240 000–320 000]	270 000 [220 000–310 000]	0,3% [0,2%–0,3%]
Восточная Азия	850 000 [700 000–1,0 миллиона]	75 000 [58 000–88 000]	59 000 [46 000–71 000]	<0,1% [<0,1%]
Латинская Америка	2,0 миллиона [1,8–2,2 миллиона]	170 000 [150 000–200 000]	77 000 [66 000–89 000]	0,6% [0,5%–0,6%]
Северная Америка	1,4 миллиона [1,2–1,6 миллиона]	55 000 [36 000–61 000]	25 000 [20 000–31 000]	0,4% [0,3%–0,5%]
Западная и Центральная Европа	850 000 [710 000–970 000]	30 000 [23 000–35 000]	13 000 [10 000–15 000]	0,3% [0,2%–0,3%]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,5 миллиона [1,4–1,7 миллиона]	110 000 [100 000–130 000]	87 000 [72 000–110 000]	0,7% [0,6%–0,8%]
Карибский бассейн	240 000 [220 000–260 000]	20 000 [16 000–24 000]	12 000 [9300–14 000]	1,0% [0,9%–1,1%]
Ближний Восток и Северная Африка	310 000 [250 000–380 000]	35 000 [24 000–46 000]	20 000 [15 000–25 000]	0,2% [<0,2%–0,3%]
Океания	59 000 [51 000–68 000]	3900 [2900–5100]	2000 [1100–3100]	0,3% [<0,3%–0,4%]
Всего	33,4 миллиона [31,1–35,8 миллиона]	2,7 миллиона [2,4–3,0 миллиона]	2 миллиона [1,7–2,4 миллиона]	0,8% [<0,8%–0,8%]

Источник: Доклад об эпидемии СПИДа, декабрь 2009 г.

Профилактика ВИЧ

- Процент ВИЧ-позитивных беременных женщин, получающих **лечение для профилактики передачи от матери ребенку, увеличился с 35% в 2007 году до 45% в 2008 году.**
- Последние данные указывают на то, что менее **40% молодых людей имеют основную информацию о ВИЧ** и менее 40% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус.
- Число новых ВИЧ-инфекций по-прежнему опережает число людей, получающих лечение: на каждые **два человека, начинающих лечение, приходится пять новых случаев заражения ВИЧ.**

Лечение

- По состоянию на конец 2008 года в странах с низким и средним уровнем доходов **доступ к лечению имели более 4 миллионов человек**, в то время как в конце 2007 года это число составляло 3 миллиона человек.
- Это составляет **рост на 36% за один год** и рост в 10 раз за период в 5 лет.
- По оценкам, в 2008 году **в странах с высоким уровнем доходов лечение получали 700 000 человек**, таким образом, общее число людей, получающих лечение **во всем мире, составило не менее 4,7 миллиона человек.**
- Несмотря на значительный прогресс, глобальный охват остается низким: в 2008 году **лишь 42% людей, нуждающихся в лечении, имели доступ к такому лечению (33% в 2007 году).**
- В 2008 году **лишь 38% детей, нуждающихся в лечении, получали такое лечение** в странах с низким и средним уровнем доходов.

Охват антиретровирусной терапией (АРТ) в 2008 году

Географический регион	Число людей, получающих АРТ, дек. 2008 г.	Число людей, нуждающихся в АРТ, 2008 г.	Охват АРТ, дек. 2008 г.	Число людей, получающих АРТ, дек. 2007 г.	Число людей, нуждающихся в АРТ, 2007	Охват АРТ, дек. 2007 г.
Африка к югу от Сахары	2,9 миллиона	6,7 миллиона	44%	2,1 миллиона	6,4 миллиона	33%
Латинская Америка и Карибский бассейн	445 000	820 000	54%	390 000	770 000	50%
Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия	565 000	1,5 миллиона	37%	420 000	1,5 миллиона	29%
Европа, Центральная Азия	85 000	370 000	23%	54 000	340 000	16%
Ближний Восток и Северная Африка	10 000	68 000	14%	7000	63 000	11%
Всего	4 миллиона	9,5 миллиона	42%	2,97 миллиона	9 миллионов	33%

Источник: *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report 2009*, WHO/UNAIDS/UNICEF, September 2009.

Туберкулез и ВИЧ

- **Одна треть людей, живущих с ВИЧ, имеет также ТБ.** Туберкулез является одной из основных причин смерти среди людей, живущих с ВИЧ, и в то же время ТБ, как правило, можно излечить и предупредить.

Имеющиеся ресурсы и потребности

- По оценкам, в 2008 году объем средств, выделяемых в связи с ВИЧ из всех источников, **составил 15,6 миллиарда долларов США.**
- По оценкам ЮНЭЙДС, **в 2010 году** для оказания услуг в связи с ВИЧ потребуется **25 миллиардов долларов США.**

Для контактов:

Пресс-офис ЮНЭЙДС | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | www.unaids.org