

Азия

Последние эпидемиологические тенденции

- В 2008 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ в Азии, составило 4,7 [3,8–5,5] миллиона человек.
- Число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось с 400 000 [310 000–480 000] в 2001 году до 350 000 [270 000–410 000] в 2008 году.
- По оценкам, в 2008 году от заболеваний, связанных со СПИДом, умерли 330 000 [260 000–400 000] человек. В то время как в Южной и Юго-Восточной Азии ежегодное число смертей в связи ВИЧ в 2008 году оказалось примерно на 12% меньше чем в 2004 году, когда был зарегистрирован пиковый показатель смертности, в Восточной Азии этот показатель продолжает увеличиваться.
- Азия, где проживает 60% мирового населения, уступает только Африке к югу от Сахары по числу людей, живущих с ВИЧ. Примерно половина всех случаев ВИЧ в Азии приходится на **Индию**.
- За исключением **Таиланда** во всех странах Азии показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составляет менее 1%.
- В то время как эпидемия в регионе в целом, вероятно, стабилизировалась, в некоторых частях региона, например, в **Бангладеш** и **Пакистане**, показатель распространенности ВИЧ растет.
- В некоторых штатах **Индии** (Андхра-Прадеш, Карнатака, Махараштра и Тамилнаду) показатель распространенности ВИЧ среди женщин в возрасте 15–24 лет, посещающих женские консультации, снизился с 2000 по 2007 годы на 54%.
- Пропорция женщин, живущих с ВИЧ в этом регионе, выросла с 19% в 2000 году до 35% в 2008 году. В 2007 году в **Индии** на женщин приходилось около 39% всех ВИЧ-инфекций.
- Региональная картина, характеризующая расширение масштабов лечения, носит смешанный характер. По состоянию на декабрь 2008 года 37% людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии в Азии, получали такое лечение. Это означает, что за пять лет доступ к лечению расширился в 7 раз.
- Необходимы неотложные меры для улучшения услуг по тестированию на ВИЧ в этом регионе. В **Китае** диагностику прошли менее одной трети людей, живущих с ВИЧ.

Динамика развития эпидемии в регионе

- Несмотря на то что эпидемия в Азии давно концентрируется в конкретных группах населения, в частности среди работников секс-бизнеса и их клиентов, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и потребителей инъекционных наркотиков, она постоянно расширяется и охватывает группы населения с низким уровнем риска вследствие передачи ВИЧ половым партнерам людей, которым грозит самый высокий риск.

- В **Китае**, где ранее эпидемия развивалась в результате передачи ВИЧ через употребление инъекционных наркотиков, сейчас ведущим способом передачи ВИЧ стали гетеросексуальные контакты.
- Во многих странах Азии работникам секс-бизнеса грозит очень высокий риск заражения. В **Мьянме** более 18% женщин-работниц секс-бизнеса инфицированы ВИЧ. В **Китае** 60% женщин-работниц секс-бизнеса не пользуются презервативами постоянно во время контактов с клиентами.
- Мужчинам-работникам секс-бизнеса также грозит высокий риск заражения ВИЧ. В **Индонезии** показатель распространенности ВИЧ среди мужчин-работников секс-бизнеса (20,3%) почти в три раза выше, чем среди женщин-работниц секс-бизнеса (7,1%).
- В Азии более 4,5 миллиона человек употребляют инъекционные наркотики. Самое большое оценочное число потребителей инъекционных наркотиков проживает в **Китае** – около 2,4 миллиона человек. В **Исламской Республике Иран**, по оценкам, проживает от 70 000 до 300 000 потребителей инъекционных наркотиков, в то время как в **Пакистане** это число составляет от 54 000 до 870 000 человек.
- Некоторые страны предприняли шаги для внедрения программ по профилактике новых инфекций среди потребителей инъекционных наркотиков. В 2007 году **Индонезия** пересмотрела свою национальную стратегию по СПИДу, включив в нее снижение вреда; кроме того, суд страны постановил, что вместо тюремного заключения в отношении потребителей наркотиков следует применять лечение от наркозависимости. Программы снижения вреда были реализованы в **Китае** и **Индии**.
- В Азии шансы заражения ВИЧ для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, составляют примерно один к пяти. Высокие уровни заражения ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, были отмечены в **Мьянме** (29,3%), **Бангкоке** (30,7%), Чунцине, **Китай** (12,5%), на юге **Индии** (от 7,6% до 18,1%) и в **Индонезии** (5,2%).

Для контактов:

Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org