

L'épidémie mondiale de sida

- Depuis le début de l'épidémie, près de 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 25 millions de personnes sont décédées de causes liées au VIH.
- En 2008, il y a eu quelque 33,4 millions [31,1 millions-35,8 millions] de personnes vivant avec le VIH, quelque 2,7 millions [2,4 millions-3,0 millions] de nouvelles infections et 2 millions [1,7 million-2,4 millions] de décès liés au sida.
- En 2008, environ 430 000 [240 000-610 000] enfants sont nés avec le VIH, ce qui porte à 2,1 millions [1,2 million-2,9 millions] le nombre total d'enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH.
- Les jeunes représentent environ 40% de l'ensemble des infections à VIH chez l'adulte (15+) dans le monde.
- L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée et abrite 67% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH dans le monde et 91% du total des nouvelles infections parmi les enfants.
- En Afrique subsaharienne, l'épidémie a rendu orphelins plus de 14 millions d'enfants.

Statistiques régionales

	Personnes vivant avec le VIH	Nouvelles infections à VIH 2008	Décès liés au sida 2008	Prévalence du VIH chez l'adulte (%)
Afrique subsaharienne	22,4 millions [20,8–24,1 millions]	1,9 million [1,6–2,2 millions]	1,4 million [1,1–1,7 million]	5,2% [4,9%–5,4%]
Asie du Sud et du Sud-Est	3,8 millions [3,4–4,3 millions]	280 000 [240 000–320 000]	270 000 [220 000–310 000]	0,3% [0,2%–0,3%]
Asie de l'Est	850 000 [700 000–1,0 million]	75 000 [58 000–88 000]	59 000 [46 000–71 000]	<0,1% [<0,1%]
Amérique latine	2,0 millions [1,8–2,2 millions]	170 000 [150 000–200 000]	77 000 [66 000–89 000]	0,6% [0,5%–0,6%]
Amérique du Nord	1,4 million [1,2–1,6 million]	55 000 [36 000–61 000]	25 000 [20 000–31 000]	0,4% [0,3%–0,5%]
Europe occidentale et centrale	850 000 [710 000–970 000]	30 000 [23 000–35 000]	13 000 [10 000–15 000]	0,3% [0,2%–0,3%]
Europe orientale et Asie centrale	1,5 million [1,4–1,7 million]	110 000 [100 000–130 000]	87 000 [72 000–110 000]	0,7% [0,6%–0,8%]
Caraïbes	240 000 [220 000–260 000]	20 000 [16 000–24 000]	12 000 [9300–14 000]	1,0% [0,9%–1,1%]
Moyen-Orient et Afrique du Nord	310 000 [250 000–380 000]	35 000 [24 000–46 000]	20 000 [15 000–25 000]	0,2% [<0,2%–0,3%]
Océanie	59 000 [51 000–68 000]	3900 [2900–5100]	2000 [1100–3100]	0,3% [<0,3%–0,4%]
Total	33,4 millions [31,1–35,8 millions]	2,7 millions [2,4–3,0 millions]	2 millions [1,7–2,4 millions]	0,8% [<0,8%–0,8%]

Source : Le point sur l'épidémie de sida décembre 2009.

Prévention du VIH

- Le pourcentage des femmes enceintes séropositives au VIH bénéficiant d'un traitement pour prévenir la transmission mère-enfant s'est accru de 35% en 2007 à 45% en 2008.
- Les dernières données indiquent que moins de 40% des jeunes ont des informations de base sur le VIH et moins de 40% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut.
- Le nombre des nouvelles infections à VIH continue à devancer le nombre des personnes sous traitement – pour deux personnes entamant un traitement, cinq autres sont infectées par le virus.

Traitement

- Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, plus de 4 millions de personnes avaient accès au traitement à la fin de 2008, contre environ 3 millions à la fin de 2007.
- Cela représente une augmentation de 36% en un an et une multiplication par 10 en cinq ans.
- Dans les pays à revenu élevé, on estime à 700 000 le nombre des personnes ayant bénéficié d'un traitement en 2008, ce qui porte le total mondial à au moins 4,7 millions.
- Malgré des progrès considérables, la couverture mondiale reste faible : en 2008, seules 42% des personnes qui avaient besoin d'un traitement y avaient accès (contre 33% en 2007).
- En 2008, seuls 38% des enfants nécessitant un traitement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en ont bénéficié.

Couverture de la thérapie antirétrovirale (TAR), 2008

Région géographique	Personnes bénéficiant d'une TAR, déc. 2008	Personnes nécessitant une TAR, 2008	Couverture TAR, déc. 2008	Personnes bénéficiant d'une TAR, déc. 2007	Personnes nécessitant une TAR, 2007	Couverture TAR, déc. 2007
Afrique subsaharienne	2,9 millions	6,7 millions	44%	2,1 millions	6,4 millions	33%
Amérique latine et Caraïbes	445 000	820 000	54%	390 000	770 000	50%
Asie de l'Est, du Sud et du Sud-Est	565 000	1,5 million	37%	420 000	1,5 million	29%
Europe, Asie centrale	85 000	370 000	23%	54 000	340 000	16%
Moyen-Orient, Afrique du Nord	10 000	68 000	14%	7000	63 000	11%
Total	4 millions	9.5 millions	42%	2,97 millions	9 millions	33%

Source : *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report 2009*, OMS/ONUSIDA/UNICEF, septembre 2009.

Tuberculose et VIH

- Un tiers des personnes vivant avec le VIH sont coinfectedées par la tuberculose. La tuberculose est une cause principale de décès parmi les personnes vivant avec le VIH et pourtant elle est en général curable et évitable.

Disponibilité des ressources et besoins

- En 2008, on estimait à US\$ 15,6 milliards la somme disponible pour le VIH, en provenance de toutes les sources.
- L'ONUSIDA estime que US\$ 25 milliards seront nécessaires pour les services VIH en 2010.

Contact: Bureau de presse ONUSIDA | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | www.unaids.org