

## **Amérique du Nord et Europe occidentale et centrale**

### **Dernières données épidémiologiques**

- En 2008, 55 000 [36 000–61 000] nouvelles infections à VIH sont survenues en Amérique du Nord et 30 000 [23 000-35 000] en Europe occidentale et centrale.
- Les progrès réalisés pour réduire le nombre des nouvelles infections à VIH ont été en perte de vitesse dans les pays à revenu élevé. Entre 2000 et 2007, le taux des cas d'infection à VIH nouvellement signalés en Europe a presque doublé.
- Aux **Etats-Unis d'Amérique**, le nombre annuel des nouvelles infections à VIH est resté relativement stable depuis le début des années 1990, bien que le nombre annuel des nouvelles infections à VIH en 2006 (56 300) ait été de 40% supérieur à celui qui avait été estimé auparavant.
- Au **Canada**, les estimations suggèrent que l'incidence annuelle du VIH pourrait avoir augmenté entre 2002 et 2005.
- Les épidémies nationales en Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale sont concentrées parmi des populations clés exposées à un risque accru, en particulier les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables et les immigrés. Au sein de ces régions, les taux des nouvelles infections à VIH semblent être les plus élevés aux **Etats-Unis d'Amérique** et au **Portugal**.
- Des signes indiquent que le nombre des nouvelles infections à VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes a augmenté au cours de la décennie écoulée dans les pays à revenu élevé, tandis que les taux des nouvelles infections parmi les consommateurs de drogues injectables ont chuté.
- Bien que les Africains-Américains représentent 12% de la population des **Etats-Unis d'Amérique**, ils constituaient 46% de la prévalence du VIH et 45% des nouvelles infections à VIH en 2006.
- Les hommes surpassent les femmes en nombre tant pour la prévalence que l'incidence du VIH de plus de 2:1 en Amérique du Nord et en Europe occidentale et centrale. Aux **Etats-Unis d'Amérique**, les hommes représentaient 73% des nouvelles infections à VIH en 2006.
- Du fait de l'accès étendu à la thérapie antirétrovirale dans les pays à revenu élevé, le nombre des décès liés au sida a considérablement baissé. Aux **Etats-Unis d'Amérique**, en 2007 le nombre des décès liés au sida était de 69% inférieur à ce qu'il était en 1994. En **Suisse**, la baisse du nombre des décès liés au sida a été encore plus nette, passant de plus de 600 en 1995 à moins de 50 en 2008.
- Le diagnostic précoce du VIH reste un défi dans les pays à revenu élevé. Aux **Etats-Unis d'Amérique**, 21% des personnes vivant avec le VIH, et 27% au **Canada**, ne connaissent pas leur statut VIH. Pour l'Europe dans son ensemble, entre 15% et 38% des personnes séropositives au VIH sont diagnostiquées tardivement.

- En **France**, aux **Etats-Unis d'Amérique** et au **Royaume-Uni**, les personnes ayant contracté l'infection à VIH par la voie hétérosexuelle sont plus susceptibles d'être diagnostiquées tardivement au cours de l'infection.

### Principales dynamiques régionales

- Les rapports sexuels entre hommes représentent le principal mode de transmission en Amérique du Nord et dans l'Union européenne. Aux **Etats-Unis d'Amérique**, le taux des nouvelles infections à VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes s'est régulièrement accru depuis le début des années 1990, augmentant de plus de 50% entre 1991-1993 et 2003-2006. Au **Royaume-Uni**, les cas de VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes a augmenté de 74% entre 2000 et 2007. En Europe dans son ensemble, le nombre des cas a augmenté de 39% entre 2003 et 2007.
- Bien que la transmission du VIH ait constitué 29% des cas d'infection à VIH nouvellement diagnostiqués en Europe occidentale, elle représentait une majorité (53%) des nouveaux diagnostics de VIH en Europe centrale.
- Le nombre des consommateurs de drogues injectables infectés par le VIH a considérablement baissé depuis le début de l'épidémie. Aux **Etats-Unis d'Amérique**, 30 000 consommateurs de drogues injectables étaient infectés chaque année par le VIH en 1984-1986, contre moins de 10 000 en 2006. En Europe occidentale et centrale, les consommateurs de drogues injectables représentaient 8% et 13%, respectivement, des nouveaux diagnostics de VIH.
- En **Suisse**, où la consommation de drogues injectables constituait la majorité des infections à VIH à la fin des années 1980, elle ne représentait plus que 4% des nouveaux cas en 2008. De même, les consommateurs de drogues injectables représentaient 5% des nouvelles infections aux **Pays-Bas**.
- En Europe, la transmission mère-enfant du VIH a été virtuellement éliminée du fait de la disponibilité des services de prévention du VIH pour les femmes enceintes.
- En Amérique du Nord, l'incidence du VIH parmi les nourrissons a décliné. Au **Canada**, le taux d'infection a chuté de 22% en 1997 à 3% en 2006. A New York, le nombre des nourrissons infectés par le VIH a passé de 370 en 1992 à 20 en 2005.

Contact: Sophie Barton-Knott | +41 22 7911697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org