

Северная Америка, Западная и Центральная Европа

Общий обзор

- В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке, Западной и Центральной Европе, составляло примерно 2 миллиона человек и 65 000 человек заразились этим вирусом.
- Широкий доступ к антиретровирусному лечению позволил удержать показатель смертности от СПИДа в 2005 году на относительно низком уровне (около 30 000 смертей).
- Меры в ответ на СПИД не соответствуют изменениям в развитии эпидемий в Северной Америке, Западной и Центральной Европе; существует неотложная потребность в улучшении услуг по профилактике, диагностике и лечению в связи с ВИЧ для иммигрантов и мигрантов, этнических меньшинств и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Ситуация в странах

- Число людей, живущих с ВИЧ в **Соединенных Штатах**, достигло своего самого высокого уровня за всю историю – в 2005 году это число составляло 1,2 миллиона человек, а национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 0,6%.
- Широкий доступ к антиретровирусному лечению в **Соединенных Штатах** позволил удержать показатель смертности от СПИДа на относительно низком уровне (около 16 000 смертей в 2005 году). Однако результаты, достигнутые на фронте профилактики на ранней стадии, не были сохранены, и количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ с конца 1990-х годов менялось лишь незначительно. Половина всех новых ВИЧ-инфекций, диагностированных в 2004 году, была обнаружена среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, а результаты ряда исследований указывают на возрождение рискованного поведения в этой группе населения.
- В **Соединенных Штатах** растет число инфицированных женщин. Каждая четвертая женщина, у которой в 2003 году был диагностирован ВИЧ, заразилась

в результате употребления инъекционных наркотиков. СПИД является ведущей причиной смерти среди афроамериканок в возрасте 25–34 лет (78% из них заразились в результате гетеросексуальных контактов).

- Афроамериканцы составляют чуть более 12% населения в **США**, однако на них приходится 50% всех новых диагнозов ВИЧ, в то же время вероятность получения антиретровирусного лечения для афроамериканцев в два раза ниже по сравнению с другими группами населения.
- Эпидемия в **Канаде** намного меньше по своим масштабам, а ежегодное число новых ВИЧ-инфекций с 2002 года остается на уровне около 2500. Незащищенный секс между мужчинами остается основным путем передачи ВИЧ (43% новых диагнозов в первые шесть месяцев 2005 года), в то же время растет число инфицированных женщин. В 2004 году на женщин приходилось 27% новых диагнозов по сравнению с чуть более 10% в 1995 году.
- Эпидемия в **Канаде** оказывает диспропорциональное воздействие на коренное население. Несмотря на то что коренные жители составляют лишь 3% населения, на них приходится 5%–8% новых ВИЧ-инфекций.
- В 2005 году, по оценкам, число людей, живущих с ВИЧ в **Западной и Центральной Европе**, составляло 720 000 человек. Основным способом передачи ВИЧ в ряде стран являются гетеросексуальные контакты.
- В **Великобритании** число новых диагнозов ВИЧ ежегодно увеличивалось начиная с 2000 года и в 2005 году достигло примерно 7700. Этот рост в основном обусловлен гетеросексуальной передачей, причем более трех четвертых (77%) новых инфекций завозится из стран с высоким показателем распространенности ВИЧ.
- Важным фактором в развитии эпидемии в **Великобритании** остается небезопасный секс между мужчинами, который обуславливает примерно одну треть новых ВИЧ-инфекций; исследования показывают, что сексуальное поведение с высоким уровнем риска среди этой группы не снижается.
- В **Бельгии, Германии, Дании, Франции и Швеции** по крайней мере одна треть ВИЧ-инфекций, обусловленных гетеросексуальными контактами, вероятно, была завезена из-за рубежа – в основном из Африки к югу от Сахары.

- В настоящее время почти половина (49%) всех новых ВИЧ-инфекций в **Германии** обусловлена небезопасным сексом между мужчинами; для сравнения в 2001 году эти инфекции составляли чуть более одной трети (37%).
- В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в **Испании**, составляло 140 000 человек. Внедрение программ заместительного лечения метадонном и обмена игл в 1990-х годах в **Испании** позволило заметно уменьшить число ВИЧ-инфекций среди потребителей инъекционных наркотиков.
- В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в **Португалии**, составляло, по оценкам, 32 000 человек. В 2004 году в **Португалии** были зарегистрированы 2400 новых диагнозов ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков, что оказалось менее половины от числа таких инфекций, зарегистрированных в 2000 году.
- Ежегодное число случаев ВИЧ в **Польше** постоянно нарастало с 2001 года; в 2005 году число людей, живущих с ВИЧ, по оценкам, составило 25 000 человек. Основной причиной такого роста являются незащищенные гетеросексуальные контакты и секс между мужчинами.

Лица для контактов

Доминик де Сантис | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 4509 | desantis@unaids.org

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org