

Океания

Общий обзор

- По состоянию на конец 2005 года число людей, живущих с ВИЧ в Океании, составляло 78 000 человек.
- В 2005 году региональный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 0,3%. В 2005 году в Океании, по оценкам, от болезней, обусловленных СПИДом, умерли 3400 человек и 7200 человек заразились ВИЧ.
- Лечение широко распространено в странах, имеющих зрелые эпидемии, что позволило сохранить на относительно низком уровне показатель смертности в связи со СПИДом.

Ситуация в странах

- На **Папуа – Новую Гвинею** приходится более 90% всех ВИЧ-инфекций, зарегистрированных на данный момент в Океании, причем эпидемия продолжает нарастать угрожающими темпами. Начиная с 1997 год ежегодно число диагнозов ВИЧ увеличивалось примерно на 30%. В 2005 году, по оценкам, 60 000 граждан **Папуа – Новой Гвинеи** жили с ВИЧ, а показатель распространенности ВИЧ составлял 1,8%.
- Социально-культурные нормы в **Папуа – Новой Гвинее** способствуют сильной дискриминации в отношении женщин, причем здесь отмечены высокие уровни сексуального насилия против женщин. Заметную роль играют платный секс и случайные половые связи, в то время как практика пользования презервативами в целом распространена слабо. В 2004 году в столице страны Порт-Морсби 20% людей, обратившихся по поводу лечения в связи с инфекциями, передающимися половым путем, имели положительную реакцию на ВИЧ.
- В 2005 году в **Австралии** число людей, живущих с ВИЧ, по оценкам, составляло 16 000 человек. После снижения ежегодного числа новых ВИЧ-инфекций в конце 1990-х годов сейчас этот показатель опять приблизился к прежнему уровню – в 2004 году было зарегистрировано 820 случаев ВИЧ. Растет число новых ВИЧ-инфекций (в основном обусловленных незащищенными половыми контактами, преимущественно между мужчинами), что, вероятно, отражает возрождение рискованного сексуального поведения.
- Несмотря на то что национальные тренды, отражающие число ВИЧ-инфекций, в целом выглядят идентичными для коренного и некоренного

населения, недавно проведенное исследование указало на заметные расхождения между ними в Западной **Австралии**. В то время как в 1985–2002 годах число ВИЧ-инфекций среди некоренных жителей Австралии уменьшилось, число таких инфекций среди аборигенов, мужчин и женщин, увеличилось.

- С 1999 года ежегодное число новых диагнозов ВИЧ в **Новой Зеландии** увеличилось более чем в два раза – с менее 80 до 183 в 2005 году, – однако национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых остается очень низким – менее 0,2%. Последние тенденции в основном обусловлены ростом числа диагнозов ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- В остальных странах Океании уровни распространенности ВИЧ-инфекций остаются низкими, однако ситуация может измениться. На **Вануату** более 40% беременных женщин имели хотя бы одну инфекцию, передающуюся половым путем; то же самое было зарегистрировано среди 43% беременных женщин в столице **Самоа** Апии. В Дили, **Восточный Тимор**, 60% работников секс-бизнеса имели положительную реакцию по крайней мере на одну инфекцию, передающуюся половым путем; это также касается почти 30% водителей такси и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Лица для контактов

Доминик де Сантис | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 4509 | desantisd@unaids.org

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org