

## Asia

### Panorama general

- Las últimas estimaciones indican que unos 8,3 millones de personas vivían con el VIH en Asia a final de 2005, más de dos tercios de ellas en un solo país: la India.
- Más de una cuarta parte del número total de personas que vivían con el VIH en Asia eran mujeres adultas: 2,4 millones. Se estima que unos 180 000 niños estaban infectados por el virus
- El VIH infectó a unas 930 000 personas durante 2005 y, según las estimaciones, el SIDA se cobró unas 600 000 vidas.
- El número de personas que reciben terapia antirretrovírica aumentó de 70 000 en 2003 a 180 000 al final de 2005. En Asia está recibiendo tratamiento antirretrovírico aproximadamente una de cada seis personas (16%) que lo necesitan.
- La prevalencia del VIH ha seguido disminuyendo en cuatro estados de la **India**, así como en **Camboya** y **Tailandia**. Sin embargo, está aumentando en otros países, como **China**, **Indonesia** y **Viet Nam**, y se observan signos de brotes de VIH en **Bangladesh** y el **Pakistán**.

### Tendencias en los países

- En la **India**, el segundo país más poblado del mundo, se estima que 5,7 millones de adultos y niños vivían con el VIH en 2005, y la prevalencia nacional en adultos se mantuvo en el 0,9%. La prevalencia del VIH tiende a ser mayor en los estados peninsulares industrializados.
- En Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, la prevalencia del VIH entre mujeres embarazadas de 15-24 años disminuyó del 1,7% en 2000 al 1,1% en

2004. Los dos últimos estados figuran entre los primeros que respondieron a la epidemia en la **India**, y las tendencias actuales reflejan sus esfuerzos sostenidos de prevención durante los últimos años.

- La mayoría de las infecciones por el VIH en la **India** (más del 80% de los casos comunicados de SIDA) son debidas al coito heterosexual sin protección. El consumo de drogas intravenosas es el principal impulsor de las epidemias de VIH en el nordeste, mientras que en otras partes del país existe un solapamiento considerable entre consumo de drogas intravenosas y comercio sexual. En Tamil Nadu se ha registrado una prevalencia del VIH del 50% entre algunos profesionales del sexo. La **India** tiene más del 70% de las necesidades totales de tratamiento en la región, pero en 2005 estaban recibiendo terapia antirretrovírica mucho menos del 10% de las personas que la necesitan.
- En **China**, alrededor de 650 000 personas vivían con el VIH en 2005. Los consumidores de drogas intravenosas representan prácticamente la mitad (44%) de las personas infectadas. Casi la mitad de los consumidores de drogas intravenosas en China comparten agujas y jeringas, y uno de cada 10 también tiene relaciones sexuales de alto riesgo.
- El VIH se está propagando a la población general a partir de consumidores de drogas, profesionales del sexo y sus clientes, de modo que en **China** también está aumentando la proporción de infecciones por el VIH entre las mujeres. En 2004, éstas constituían el 39% de los casos comunicados de VIH, frente al 25% sólo dos años antes. En ciertas partes de las provincias de Yunnan, Henan y Xinjiang, la prevalencia del VIH ya supera el 1% entre las mujeres embarazadas y las que se someten a la prueba del VIH por motivos clínicos o antes del matrimonio.
- El programa «Cuatro servicios gratis y una ayuda» de **China**, que ofrece de forma gratuita terapia antirretrovírica, fármacos para prevenir la transmisión materno-infantil, escolarización de los niños huérfanos y asistencia y ayuda económica a los hogares afectados, puede erigirse en un modelo para otros países que se propongan apoyar a las familias y sociedades afectadas por el SIDA. En **China**, en 2005 recibía fármacos antirretrovíricos aproximadamente el 25% de las personas que los necesitaban.

- En **Camboya**, la prevalencia nacional del VIH en adultos (1,6%) era un tercio menor en 2005 que a finales de los años 1990, debido principalmente a una combinación de tasas crecientes de mortalidad y esfuerzos redoblados de prevención para reducir las relaciones sexuales remuneradas sin protección. Sin embargo, el país continúa soportando una de las peores epidemias de Asia, en la que las mujeres constituyen una porción creciente de las personas que viven con el VIH (el 47% en 2003 frente al 37% en 1998, según las estimaciones).
  
- En **Tailandia** se calcula que la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 1,4% en 2005. Los esfuerzos de prevención han dado lugar a niveles decrecientes del VIH desde finales de los años 1990, con menos varones que pagan por mantener relaciones sexuales y un uso cada vez más habitual de preservativos. Sin embargo, algunos estudios recientes indican que las relaciones sexuales prematrimoniales se han vuelto más comunes entre los jóvenes tailandeses y que más de un tercio de las infecciones por el VIH en 2005 correspondieron a mujeres que habían sido infectadas por sus parejas habituales.
  
- Según las estimaciones oficiales, en **Tailandia** unas 80 000 personas VIH-positivas habían recibido tratamiento antirretrovírico a finales de 2005. El despliegue de esta terapia ha coincidido con una reducción drástica en el número de fallecimientos por SIDA comunicados oficialmente: de 5020 en 2004 a 1640 en 2005.
  
- **Myanmar** padece una de las epidemias más graves de la región. Se estima que en 2005 había 360 000 personas que vivían con el VIH y que la prevalencia nacional del VIH en adultos se mantenía en torno al 1,3%. Sin embargo, la ampliación reciente de los esfuerzos ha provocado un descenso en la prevalencia nacional del VIH entre mujeres embarazadas, que ha pasado del 2,2% en 2000 al 1,8% en 2004.
  
- En **Viet Nam**, el VIH se ha propagado a la totalidad de las 59 provincias y a todas las ciudades. Aproximadamente 260 000 personas vivían con el VIH en 2005, más del doble que en 2000. Se calcula que el pasado año la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 0,5%. Según las estimaciones oficiales, casi 40 000 personas se infectan por el VIH cada año. El consumo de drogas intravenosas y el comercio sexual son los principales factores que impulsan la epidemia. La prevalencia del VIH entre consumidores de drogas intravenosas aumentó del 9% en 1996 al 29% en 2002 y al 32% en 2003, y en algunas ciudades se han registrado niveles de infección de hasta el 40%.

- En el **Pakistán**, unas 85 000 personas estaban infectadas por el VIH en 2005. El país tendrá que mejorar sus esfuerzos de prevención si pretende evitar brotes graves de VIH. En 2004 era VIH-positivo casi uno de cada cuatro consumidores de drogas intravenosas que se hicieron la prueba del VIH en Karachi; menos de un año antes, sólo se había detectado un caso de seropositividad en el mismo colectivo.
- Por lo que se refiere a **Indonesia**, hay en curso una grave epidemia de VIH en **Papua**, donde el virus se ha propagado más allá de los profesionales del sexo y sus clientes y donde resultaron VIH-positivos casi el 1% de los adultos sometidos a análisis en cinco aldeas. Se ha registrado una prevalencia del VIH de hasta el 48% entre consumidores de drogas intravenosas en centros de rehabilitación de Yakarta, y se han comunicado niveles aún más altos de infección en Pontianak, en la isla de **Borneo**.
- En **Bangladesh**, la prevalencia nacional del VIH en adultos todavía es muy baja (inferior al 0,1%), debido en parte a los esfuerzos orientados de prevención que han permitido mantener por debajo del 1% la prevalencia del VIH en varones que tienen relaciones sexuales con varones y en profesionales del sexo femeninas.
- **Filipinas** y la **República Democrática Popular Lao** están experimentando epidemias muy limitadas, con una prevalencia inferior al 0,1% en ambos países.

### **Contacto**

Dominique De Santis / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 4509 / [desantis@unhcr.org](mailto:desantis@unhcr.org).

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / [bartonknotts@unhcr.org](mailto:bartonknotts@unhcr.org).