

El Caribe

Panorama general

- El Caribe es la segunda región más afectada del mundo después de África, con una prevalencia del VIH del 1,6%.
- Las mujeres adultas representan el 51% del número total de personas que viven con el VIH en la región.
- Se estima que durante 2005 se infectaron por el VIH 37 000 personas.
- El SIDA es la principal causa de mortalidad entre los adultos de 15-44 años, y se calcula que se cobró 27 000 vidas en 2005
- En conjunto, en 2005 recibía terapia antirretrovírica menos de una de cada cuatro personas (23%) que la necesitaban.
- Los niveles de infección por el VIH han disminuido en zonas urbanas de **Haití** y han permanecido estables en la vecina **República Dominicana**. El mayor acceso a tratamiento antirretrovírico en las **Bahamas** y **Barbados** parece estar reduciendo la mortalidad por SIDA.

Avances en los países

- **Haití** alberga a más personas infectadas por el VIH que cualquier otro país en la región: 190 000. Se estima que, en 2005, la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 3,8%.
- En **Haití**, el porcentaje de mujeres embarazadas VIH-positivas se redujo a la mitad desde 1993 hasta 2003-2004, especialmente en las zonas urbanas, donde la prevalencia disminuyó del 9,4% en 1993 al 3,7% en 2003. Aunque hay indicios de que han aumentado el uso de preservativos, la abstinencia y la fidelidad y que ha

disminuido el número de parejas sexuales, este descenso también puede atribuirse a la mayor mortalidad relacionada con el SIDA y a las mejoras en la seguridad sanguínea a principios de la epidemia. En **Haití**, en 2005 recibían tratamiento antirretrovírico menos del 20% de las personas que lo necesitaban.

- La prevalencia del VIH en la **República Dominicana** empezó a disminuir a mediados de los años 1990, pero, en conjunto, se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años. Según las estimaciones, la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 1,1% en 2005 y, al igual que en Haití, estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico menos del 20% de quienes lo necesitaban.
- En las **Bahamas**, la prevalencia nacional del VIH en adultos figura entre las más altas de la región, con un 3,3%. Parece que las mejoras en cuanto a atención y tratamiento han reducido el número de fallecimientos por SIDA. La prevalencia en mujeres embarazadas ha disminuido del 4% a mediados de los años 1990 a menos del 3% en 2005.
- La situación es similar en **Barbados**, donde la prevalencia nacional del VIH se mantuvo en el 1,5% en 2005. El número anual de fallecimientos por SIDA se redujo a la mitad durante el periodo 1998-2003, al igual que el número de mujeres embarazadas VIH-positivas entre 1999 y 2003. La ampliación de los servicios de asesoramiento y pruebas, junto con el suministro de tratamiento antirretrovírico, ha reducido la transmisión maternoinfantil del VIH tanto en las **Bahamas** como en **Barbados**.
- A final de 2005, **Cuba** tenía una prevalencia del VIH en adultos del 0,1%. Se estima que había unas 4800 personas que vivían con el VIH, y menos de 500 fallecieron por enfermedades asociadas al SIDA. El programa nacional de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH figura entre los más eficaces del mundo, y ha permitido que el número de neonatos con el VIH hasta ahora no llegue a los 100. **Cuba** también ofrece acceso universal y gratuito a la terapia antirretrovírica, que ha limitado el número tanto de casos de SIDA como de fallecimientos relacionados con la enfermedad.
- En **Trinidad y Tabago** se estima que la prevalencia nacional del VIH es del 2,6%, con un impacto particularmente grave en las mujeres jóvenes. Las muchachas

adolescentes (15-19 años) tienen una probabilidad seis veces mayor de estar infectadas por el VIH que sus homólogos masculinos.

- En **Guyana** está evolucionando una grave epidemia: en 2005, la prevalencia del VIH fue del 2,4% y el SIDA representó la principal causa de mortalidad entre los adultos de 25-44 años.
- Los niveles nacionales de infección por el VIH parecen haberse estabilizado en **Jamaica**, y en algunos lugares hay signos de retroceso en la prevalencia de la epidemia, a medida que un mayor número de jamaicanos decide protegerse contra la infección. La prevalencia nacional del VIH era del 1,5% en 2005, y se calcula que 25 000 adultos y niños vivían con el virus.

Contacto

Dominique De Santis / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 4509 / desantis@unaids.org.

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / bartonknotts@unaids.org.